

绥中鲁丽苹果苗长势

产品名称	绥中鲁丽苹果苗长势
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	鲁丽苹果苗:矮化苗 嫁接口粗度:0.8-1厘米 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

鲁丽苹果苗，乔化鲁丽苹果苗，矮化鲁丽苹果苗。

鲁丽苹果进入盛果期，不怕不结果，只怕结过量。要解决这一问题，实质上也是解决生殖生长与营养生长的问题。盛果期生殖生长大于营养生长，对富士特性来说，由于枝条比较柔软，容易下垂，就应该早更新，细修剪。对各个延长头来说，及早抬高角度，留旺枝、旺芽短截，更新枝组，修整果台，把结果部位控制在粗旺的枝条上。合理配置果枝组、长、中、短枝控制在2—1—7左右，枝组的修剪按三套枝修剪（结果枝、育花枝、生长枝）或把生长枝的比例放大一些。盛果期短枝比较多，合理疏除部分弱短枝，减少营养消耗。对多年连续结果衰弱下来的枝，留旺枝旺芽缩剪，尽量利用背上枝，对有花芽的枝适度见花剪截，集中营养，以供果实生长，对串花枝，分清强弱，空间大小剪截。鲁丽苹果对生长枝的修剪本着去弱留强，去下留上（特旺枝除外）或留斜的办法，缓放结果下垂后再回缩；对枝组的更新本着少留枝般（15~20厘米）、留旺枝；严格控制留果量，按专家的留果参数留果。枝果比为5~6:1；叶果比为50~70:1；花叶芽比为1:3左右。亩产控制在2500公斤。疏果的具体要求一是要注意选留健壮果枝上的果；二是注意选留无病虫害、果形端正的果；三是应多选留中果枝和较短的长果枝以及果顶向下生长的果；四是当树体上座果不均衡时，为保证产量，可对部分健壮且座果多的分枝适当多留果；五是树冠外围及上部适当少留果；六是应坚持常年疏果，即在果实的生长后期，如发现奇形果，病虫害果等应随时疏除。

鲁丽苹果施基肥，一般在10月中下旬，采用条沟法，沟深0.2-0.3米，1千克有机肥，混加根力多生物蛋白控释肥（15-10-17）3-4千克，与土混匀后施于放射沟。春季3月上中旬追肥一次，根力多生物蛋白控释肥（18-16-6）2千克，采用辐射沟法施肥5-6条，距树干0.5米，长1.2米，宽0.4米，深0.3米，肥土拌匀施入。夏季6月中旬追彭果肥一次，根力多生物蛋白控释肥（15—10—17）3千克，采用辐射沟法施肥，肥土拌匀施入。鲁丽苹果每次施肥后浇透水。每年交换施肥沟位置，现在全园80%的土壤已经被有机化。每年在萌芽前喷苯醚甲环唑2000倍加3-5%的根力多1号和0.2%尿素1次，开花前喷0.2-0.3%的硼砂和根力多1号50克2-3次，幼果期喷0.3-0.4%氨基酸钙和根力多1号100克2-3次。彭果期加喷2%硝酸钾加根力多1号1%

, 4—6次。生长季适时浇水, 浇水时盛果树和老龄树随水冲施根力多2号5公斤每亩, 促进根系迅速发育, 促生新根。浇水后和雨后及时中耕松土。