

## 布兰瑞克无花果苗种植管理

产品名称	布兰瑞克无花果苗种植管理
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	2.30/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

### 产品详情

露地栽培条件下，布兰瑞克无花果树的自然休眠需保证在 7.2

温度以下约 500 h，因而结合试验地的气候条件，扣棚时间以 12 月中旬为宜。

扣棚后，应对温室进行升温，需采取逐步升温法，切不可过快升温。在扣棚初期，温室应全部以草苫覆盖，白天拉开草苫，夜晚覆盖草苫。扣棚 7 d 后，温室则采取拉一个、隔一个的方法，在白天拉起 50% 的草苫，使其逐渐升温；待 10 d 以后，则可将温室覆盖的草苫全部拉起，并且在晴天进行午间放风，之后再快速提升室内温度。此后，则应保持温室温度稳定，开花期温室的白天温度保持在 15 ~ 18

，夜间温度保持在 5 ~ 7 ；果实成熟期温室的白天温度保持在 16 ~ 25 ，夜间温度保持在 7 ~ 10

。此外，温室内的空气湿度应控制在 70% 以下。

日光温室下无花果的病虫害危害较小，主要病虫害有炭疽病、白腐病、胴枯病与桑田牛等。针对炭疽病和白腐病，可在病害发生初期喷施 1

1 200 倍波尔多液，或喷施

50%多菌灵800倍液或70%甲基托布津800~1000倍液进行防治。针对胴枯病，应及时剪除发病枝条，用刀刮掉病变部位后涂抹石硫合剂。针对天牛，在夏秋季节经常检查树干，及时人工捕杀成虫，挖出虫卵。发现幼虫蛀的排粪口后，用敌敌畏药棉球堵塞虫孔熏杀幼虫。另外，可结合冬季剪枝剪除病枝、病果，并及时清扫落叶、整理果园。

无花果成熟期较长，一般春、夏果6月下旬到7月上旬成熟，秋果8月上旬至11月中旬成熟。同一树冠或枝条上由于开花早晚不一，成熟期也不一样，因此，无花果适宜分期采收。采收适宜在干燥的晴天进行，采收时期应无花果用途而异，当地鲜销易在九成熟时采摘，外运时易在八成熟时采摘，成熟的无花果皮薄肉软，极易腐烂变质，采后也应有一套严格的管理办法。无花果的主要加工品为制干，制干可用晒干或烘干的方法，也有少量制作糖浸无花果干的，即先行脱皮后，以浓缩糖液浸泡一两天，取出晾干，这种加工风味更佳。

泰安开发区忠信苗圃今年出圃无花果苗10万棵，可通过铁路、公路、邮局直接发货。承担一切短途包装、检疫费用。多年的信誉赢得各界人士的好评，交通便利、四通八达。可乘火车、汽车直接到达、且高速、客运站常年由固定接站车、设有办事处。提供免费住宿、吃饭、报销往返路费，完善一站式服务，确保品种纯正，质量上乘，签订有效法律合同，可，让你满意、无后顾之忧，可实地考察参观。欢迎各界人士来人来电洽谈、诚招天下客，信从誉中来。