

商洛鲁丽苹果苗几年结果

产品名称	商洛鲁丽苹果苗几年结果
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	鲁丽苹果苗:矮化苗 嫁接口粗度:0.8-1厘米 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

鲁丽苹果整形中采用的树形，乔化树一般多推广疏散分层形（也称主干疏层形），半矮化树和短枝型树多推广小冠疏层形和自由纺锤形。疏散分层形树形的结构特点是：于高50厘米~60厘米。整形完成后，全树有主枝5~6个，分两层排列（有时还有第三层）。鲁丽苹果第一层3个主枝邻接或邻近，相距在20厘米~40厘米以内，开张角60~70度。第二层2个主枝，伸展方位与第一层主枝相互插空错开，开张角比第一层主枝小，45~50度。第一、二层主枝间的距离（层间距）80厘米~100厘米。

鲁丽苹果基部三主枝上各有副主枝（也称侧枝）2个，相互错开排列，第二层主枝上各有副主枝1个。全树高4米~5米。这种树形有明显的中心干，后期落头开心。鲁丽苹果如有第三层主枝，通常为临时性生枝，在落头时除去。主枝分层着生，上小下大，层间有较大的距离。它符合鲁丽苹果的生长特性，成形较早，结构牢固，主枝能均匀占据较大的空间而通风透光良好。基部为第一层主枝，上部为第二层主枝，顶部树形完成后落头开心处。

鲁丽苹果夏剪常方法有：抹芽、刻芽、除萌、环割、摘心、扭梢、拿枝、疏枝、回缩、摘叶、别枝、圈枝等。(1)摘心：在生长期摘去枝条先端的生长点叫摘心。它可抑制新梢生长，促进侧芽萌发，增加分枝，加速扩大树冠，有利于鲁丽苹果提早结果。对结果树摘心，可调节生长势，促进花芽分化，并且能促使发育枝和徒长枝转化为结果枝。(2)扭梢：对生长较旺的新梢在生长期将枝条基部或上部扭伤下垂，但不扭断枝条。扭梢可以阻碍养分运输，削弱树势，有利于形成花芽和结果枝。(3)拿枝：在生长期将新梢自基部至顶部弯几下，鲁丽苹果使韧皮部与木质部略有脱离并受伤，拿枝至有声响，但不折断枝条。拿枝可削弱顶端优势，促使枝条中下部萌发二次枝，有利于鲁丽苹果花芽分化增加短枝数量。拿枝应在旺长期的中午前后进行为宜。(4)环割：对发育旺盛不开花结果的枝干基部，用环割器或刀环切两圈，宽度以年及时愈合为原则，大约是枝干直径的1/8或1/10。这样做可以使植株上部有机养分暂时不能向下运输，

以利营养生长向生殖生长转化形成花芽，提高坐果率。

鲁丽苹果肥水结合：平衡施肥要考虑提高树体贮藏营养，考虑苹果生长发育的连续性，节奏性和协调性。因此，保证养分的及时供应、吸收、分配、利用至关重要，在此地果树生长季节普遍降雨偏少，对于旱作农业来说加强水份管理是丰产壮树优质的关键。鲁丽苹果树正常生长要求含水量为最大持水量的60—80%，果园用水的原则是：春灌早、松土覆盖，促根生长吸收，促梢攻果，花芽分化好。苹果主要浇萌芽水；花后水；膨大水和封冻水等四次水。当然要结合实际灵活掌握。