宝鸡鲁丽苹果苗几年结果

产品名称	宝鸡鲁丽苹果苗几年结果
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	鲁丽苹果苗:矮化苗 嫁接口粗度:0.8-1厘米 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

鲁丽苹果修剪分冬季修剪（休眠期修剪） 和夏季修剪（生长期修剪） 两类、
冬季修剪的基本方法有短截、 回缩和疏枝， 有时把长放不剪也放在广义的修剪方法中。
短截又可分轻截、 中截和重截等几种不同的程度， 从而其修剪反应也不同。
对鲁丽苹果枝条轻短截或长放， 有利于缓和枝势、 树势。 对枝条中截、 重截或回缩，
有利于促进枝芽生长和枝组、 骨干枝的更新复壮。 疏枝可减少分枝， 改善光照，
并有抑前促后的作用， 有利于花芽的形成。 夏季修剪包括摘心、 抹芽、 疏梢、 扭 10 梢、 拿枝、
拉枝、 环剥等基本方法。 一般来说，鲁丽苹果 夏季修剪对树体生长有一定的抑制作用，
能缓和枝势和树势，常有利于花芽的形成， 在幼旺树上应用较多。

鲁丽苹果幼树期的修剪以选留培养骨干枝为主， 同时掌握轻剪多留辅养枝， 增加枝叶量，
使地上部和根系的生长早趋平衡， 促进成花结果。 苗木栽植后， 按不同树形要求对苗木进行短截，
称为定干。 定干时剪口下要求有 5～7 个以上的饱满芽， 20 厘米～25 厘米称为整形带。
这些鲁丽苹果芽前发成技后， 从中选留中心干的延长技及第一层主枝或较粗壮的侧生枝。
每年冬季按整形要求剪截培养中心干和各级骨干枝枝头， 注意剪口芽的质量和留芽方向。
位于中心于层间和主枝下部的生长枝， 除过密的需疏除外， 其余枝条应适当多加保留， 作为辅养枝，
并采用轻剪长放拉平的方法， 使其能辅养树体， 缓和鲁丽苹果树势及早期结果。
整形带以下定干当年不扶芽， 有利于主干的加速增粗和根系的生长，
发出的枝条中近地面的和拥挤的可疏除， 其余可控制或甩放。

鲁丽苹果盛果期施肥山东省苹果主产区在东部， 平均产量接近 3000kg/亩，
主要土壤类型是棕壤土。根据苹果养分理论吸收量(每 1000kg 苹果吸收 N、 P2O5、 K2O 分别为 3. 0kg、
0. 8kg、3. 2kg) 和当前栽培实践， 在中等肥力土壤上， 每 1000kg 苹果产量推荐施用 N7~9kg， N、P2O5、
K2O 施用比例为 1. 0： 0. 5： 1. 1。 在土壤某一养分含量过高或者过低(根据已有的数据与上述（上期）
表中养分分级指标比较) 的情况下， 可以适当调节 N、 P2O5、 K2O
三者的施用比例鲁丽苹果。第一次施肥(秋季基肥) ： 年全部有机肥， 全年 N 的 20%， P2O5 的 20%，

K2O 的 20%， 微肥可以与基肥一起施入(微肥一次施用可以持续 2~3 年有效)
。鲁丽苹果第二次施肥(次年春季萌芽前) ： 全年 N 的 50%， P2O5 的 30%。 第三次施肥(花芽分化前) ：(5 月底) 全年 N 的 30%， P2O5 的 30%， 18K2O 的 40%。

鲁丽苹果第四次施肥(果实膨大期) ： (7 月初) P2O5 的 20%， K2O 的 40%。 在需要施用钙肥的情况下，可以在果实膨大期喷洒硝酸钙， 一般喷 3~4 次， 浓度为 0. 3%。 需要施用镁肥时硫酸镁的喷洒浓度为 0. 08%~0. 15%。 硝酸钙和硫酸镁也可以作基肥施用。 在鲁丽苹果基肥没有施用微肥时，
初花期和盛花期喷洒 0. 3%的硼砂溶液(可加 1%的糖或者少量蜂蜜) 2~3 次； 鲁丽苹果在盛花期后2~3 周，每隔 7 至 10 天喷洒 0. 2~0. 3%硫酸锌溶液一次， 共喷洒 3 次。