

宝鸡鲁丽苹果苗几年结果

产品名称	宝鸡鲁丽苹果苗几年结果
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	鲁丽苹果苗:矮化苗 嫁接口粗度:0.8-1厘米 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

鲁丽苹果修剪分冬季修剪（休眠期修剪）和夏季修剪（生长期修剪）两类、冬季修剪的基本方法有短截、回缩和疏枝，有时把长放不剪也放在广义的修剪方法中。短截又可分轻截、中截和重截等几种不同的程度，从而其修剪反应也不同。对鲁丽苹果枝条轻短截或长放，有利于缓和枝势、树势。对枝条中截、重截或回缩，有利于促进枝芽生长和枝组、骨干枝的更新复壮。疏枝可减少分枝，改善光照，并有抑前促后的作用，有利于花芽的形成。夏季修剪包括摘心、抹芽、疏梢、扭10梢、拿枝、拉枝、环剥等基本方法。一般来说，鲁丽苹果夏季修剪对树体生长有一定的抑制作用，能缓和枝势和树势，常有利于花芽的形成，在幼旺树上应用较多。

鲁丽苹果幼树期的修剪以选留培养骨干枝为主，同时掌握轻剪多留辅养枝，增加枝叶量，使地上部和根系的生长早趋平衡，促进成花结果。苗木栽植后，按不同树形要求对苗木进行短截，称为定干。定干时剪口下要求有5~7个以上的饱满芽，20厘米~25厘米称为整形带。这些鲁丽苹果芽前发成枝后，从中选留中心干的延长枝及第一层主枝或较粗壮的侧生枝。每年冬季按整形要求剪截培养中心干和各级骨干枝枝头，注意剪口芽的质量和留芽方向。位于中心于层间和主枝下部的生长枝，除过密的需疏除外，其余枝条应适当多加保留，作为辅养枝，并采用轻剪长放拉平的方法，使其能辅养树体，缓和鲁丽苹果树势及早期结果。整形带以下定干当年不扶芽，有利于主干的加速增粗和根系的生长，发出的枝条中近地面的和拥挤的可疏除，其余可控制或甩放。

鲁丽苹果盛果期施肥山东省苹果主产区在东部，平均产量接近3000kg/亩，主要土壤类型是棕壤土。根据苹果养分理论吸收量(每1000kg苹果吸收N、P₂O₅、K₂O分别为3.0kg、0.8kg、3.2kg)和当前栽培实践，在中等肥力土壤上，每1000kg苹果产量推荐施用N7~9kg，N、P₂O₅、K₂O施用比例为1.0:0.5:1.1。在土壤某一养分含量过高或者过低(根据已有的数据与上述(上期)表中养分分级指标比较)的情况下，可以适当调节N、P₂O₅、K₂O三者的施用比例鲁丽苹果。第一次施肥(秋季基肥)：年全部有机肥，全年N的20%，P₂O₅的20%，

K₂O 的 20%，微肥可以与基肥一起施入(微肥一次施用可以持续 2~3 年有效)

。鲁丽苹果第二次施肥(次年春季萌芽前)：全年 N 的 50%，P₂O₅ 的 30%。第三次施肥(花芽分化前)：(5 月底) 全年 N 的 30%，P₂O₅ 的 30%，18K₂O 的 40%。

鲁丽苹果第四次施肥(果实膨大期)：(7 月初) P₂O₅ 的 20%，K₂O 的 40%。在需要施用钙肥的情况下，可以在果实膨大期喷洒硝酸钙，一般喷 3~4 次，浓度为 0.3%。需要施用镁肥时硫酸镁的喷洒浓度为 0.08%~0.15%。硝酸钙和硫酸镁也可以作基肥施用。在鲁丽苹果基肥没有施用微肥时，初花期和盛花期喷洒 0.3%的硼砂溶液(可加 1%的糖或者少量蜂蜜) 2~3 次；鲁丽苹果在盛花期后 2~3 周，每隔 7 至 10 天喷洒 0.2~0.3%硫酸锌溶液一次，共喷洒 3 次。