

# 大樱桃苗批发 栽植大樱桃苗管理技术 建岳农业

产品名称	大樱桃苗批发 栽植大樱桃苗管理技术 建岳农业
公司名称	泰安市建岳农业科技有限公司
价格	4.00/棵
规格参数	大樱桃苗:1-5年 高度:1 厂家:建岳农业
公司地址	山东省泰安高新区北集坡办事处季家庄村（注册地址）
联系电话	0538--8912239 18562357999

## 产品详情

大樱桃苗批发 栽植大樱桃苗管理技术 建岳农业大樱桃苗新品种

大樱桃苗品种保证，成活率保证当今市面上冒充瑞德大樱桃品种的很多，部分商贩为了谋取更大利益不惜用低价格发假苗铤而走险来欺骗种植户。所以希望种植户要擦亮眼睛，不要一味的贪图便宜苗低价苗，而造成不可挽回的经济损失。俗话说便宜没好货，好货不便宜。

甜樱桃土壤改良管理技术；生长发育所需的养分和水分主要是通过根系从土壤中吸收，土层厚薄、土壤质地、土壤肥力均对甜樱桃树的生长和结果有重要影响。因此，良好的土肥水管理是甜樱桃园早果早丰的基础，也是优质安全生产的基本保障。甜樱桃是对土肥水条件要求较高的树种，管理时应先了解慢桃对土肥水的需求特点并结合果园的立地条件进行具体操作。

土壤改良有些土壤性状是可延续继承的，如土壤质地

坡度和排水状况，耕作和栽培措施很难改变。对土质的常规改良办法主要是深翻熟化客土等。

常见改良方法主要是深翻熟化、深翻结合施有机肥，果园土壤的深翻熟化山区、丘陵地果园，土层较薄，土壤质地较粗保肥蓄水能力差，樱桃树向深层土生长困难，易行成小老树其对改良深层土壤物理性状更为显著。甜樱桃根系活土层以人下是半台可以显著加厚活土层。洪积或或滩涂甜樱桃园向深层土生长困难，易形成小老树，而平原冲积.促进根系F扎使树体能够健城康生长。

大樱桃苗应加强水分管理，保持花后土壤水分稳定，防止久旱后浇水过多，使土壤含水量保持在田间水量的60%~80%，防止土壤忽干忽湿。干旱时，应少水勤浇，多浇过堂水，严禁大水漫灌。有条件的可选用喷灌、滴灌等，微喷效果好。雨后要及时排水。合理施肥，及时增施有机肥，可促进根系良好生长，缓冲土壤水分的剧烈变化，减轻裂果。肥料的种类、用量、施用时期及方法等都对裂果造成影响，基肥应以有机肥、人畜粪肥为主，避免施入过多的无机氮肥。9月份，增施有机肥、土壤调理剂(硅钙钾镁)，盛果期树每株施用生物有机肥10千克左右，配合2~2.5千克土壤调理剂、1.5~2千克高含量的复合肥。果实发育期要注意氮、磷、钾等养分平衡，氮肥和钾肥不宜过多，及时补充微量元素，特别是在果实发育期注意补充钙肥，可明显降低裂果率。萌芽前和6月份，各追施1次硝酸钙和硫酸钾复合肥，每次0.5千克。

应用地表防雨设施预防甜樱桃裂果，应用高起垄、无纺布或地膜覆盖、小沟快流于一体的栽培管理模式。保证干旱季节有稳定的水能供应，降雨季节可及时排水，使土壤水分处于充足而稳定的状态，果皮细胞生长不会停止过早。行间生草利于增加土壤有机质，疏松土壤，预防涝害的发生。根据选用的树形，确定适宜的株行距，可避免果园郁闭、空气流通不畅，使果实表面附着的水分快速蒸发，预防裂果的发生。

黑珍珠樱桃苗：6月中下旬成熟,平均单果重5克,果近圆形,果顶乳头状,皮中厚,蜡质层中厚,底色红,果面紫红色,充分成熟时呈紫黑色,外表光亮似珍珠。质地松软,汁液中多,含糖量17.4%,风味浓甜,香味中等,品质极上。

萨米脱樱桃又名皇帝果，加拿大夏地农业研究所育成的中晚熟品种。果实性状：果实大，单果重达10克左右。果形长心脏形，稍长，果皮紫红色。树势强健，丰产。亩产可达2500公斤。初果期多以中、长果枝结果，盛果期以花束状果枝结果为主。萌芽率高，成枝力强，果个大，平均单果重11-13克。6月中下旬成熟，是一个很有希望的丰产品种，可推广发展。

香泉樱桃苗价格；优选出的早熟，黄红色品种，果实肾形

黄底红晕，艳丽美观。平均单果重7克，大果重9克，果肉黄色 汁多 风味浓郁，可食率94.4%，果柄短，果实发育期36天左右。成熟期5月18日前后成熟。树势中庸，树姿较开张，花白色

花粉量多，花期较早，早果性

丰产性好，各类果枝均能结果。需要配置授粉树，建议配置品种先锋，拉宾斯，雷尼，早大果。

艳阳甜樱桃苗 艳阳甜樱桃是烟台市农业科学研究院从加拿大引进，今年9月通过山东省审定。可在全省甜樱桃产区种植利用。特征特性：果实近圆形，果形端正，畸形果少，果个大，平均单果重11.23克，比对照品种拉宾斯重2~4克；果皮红色至深红色，有光泽；果肉玫瑰红色，果汁红色，果肉肥厚、脆硬，可溶性固形物17.8%，比对照品种高2.5个百分点，风味浓；自花结实率23.5%；果实发育期55天左右，在烟台地区6月中旬成熟。

产量表现：栽后第三年开始结果，第四年平均亩产420公斤，第五年896公斤，与对照品种无明显差异。

栽培技术要点：采用起垄栽植，平原地株行距3米×5米，丘陵地3米×4米；选用萨米脱、黑珍珠等品种为授粉树；采用纺锤形树型，花果和肥水管理、病虫害防治等技术与其它甜樱桃品种相同。

红蜜樱桃苗：红蜜是一个中果型、早熟、质软、黄底红色品种。树势中等，树姿开张，树冠中等偏小，芽的萌发力 and 成枝力较强，分枝较多，花芽容易形成，一般定植后第二年即可形成花芽，第三年即进入盛果初期，而且花量很多，堆适宜作为授粉品种。红蜜的坐果率高，是丰产型品种。果实中等大小，平均单果重8.0克，均匀整齐，果型为宽心脏形；果皮黄底色，大部分果面呈鲜红色；肉质较软，多汁，以甜为主，品质上等；可溶性固形物为17%；核小粘核，可食部分占92.3%。成熟期在5月底至6月上旬，比红灯晚4~5天，果实发育期40~50天。

玛瑙红樱桃苗，以其熟透的果子红中透紫，像晶莹剔透的红玛瑙而得名。玛瑙红樱桃果形心脏形，色泽度紫红艳丽，风味佳，品质上乘。其可溶性固形物为15.75%，可溶糖为11.886%，平均单果重6.2克，堆大9克。以其营养丰富，香甜可口，被誉为排毒养颜美容果。

岱红樱桃苗：平均单果重10.85克，大果达14.2克。果实为圆心脏形，果型端正，整齐美观，畸形果很少。果柄短，平均果柄长2.24厘米。果皮鲜红至紫红色，富光泽，色泽艳丽，果肉粉红色，近核处紫红色，果肉半硬，味甜适口。可溶性固形物14.8%。烟台5月中、下旬成熟，比红灯早熟3-5天，抗裂果。树势强健，枝条粗壮，花芽多，成花率高，早产早丰。是极少见的早产、早丰、大果形早熟品种。也是目前保护地栽培的应选品种之一。

早丹樱桃苗；该品种果实扁圆形，初熟时黄底红晕，完熟后全面鲜红色。果个中等，平均单果重6.23克

，大果重9.04克。果肉黄色，脆，汁多，风味酸甜可口，果核重0.58克，核长1.27厘米，可溶性固形物含量17.05%，可食率93%。果柄长，平均长度4.9厘米。果实发育期72~74天，北京地区6月中下旬成熟。

树势中庸，树姿开张。一年生枝阳面棕褐色，节间距4.3厘米，新梢微红。叶片长15.4厘米，宽6.7厘米，叶柄长3.3厘米。叶倒卵圆形，绿色；叶面平展，半革质，叶背密被短茸毛；叶尖急尖，叶基广楔形，叶缘为钝重锯齿；蜜腺近圆形，2~3个。花白色，花粉量多，花期早，萼筒内壁橘黄色，雌蕊高于雄蕊。早果性、丰产性好，自然坐果率高。花芽形成好，各类果枝均能结果，初果期以中、长果枝结果为主，进入盛果期后，以短果枝和花束状果枝结果为主。授粉品种宜选用雷尼、红灯、先锋等。

#### 大樱桃苗新品种

大樱桃苗品种保证，成活率保证当今市面上冒充瑞德大樱桃品种的很多，部分商贩为了谋取更大利益不惜用低价格发假苗铤而走险来欺骗种植户。所以希望种植户要擦亮眼睛，不要一味的贪图便宜苗低价苗，而造成不可挽回的经济损失。俗话说便宜没好货，好货不便宜。