

# 唐山油蟠桃6-6大量供应-九州红家庭农场

产品名称	唐山油蟠桃6-6大量供应-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

唐山油蟠桃6-6大量供应-九州红家庭农场桃树采果后至秋季落叶前是营养积累和花芽分化的关键时期。管理的好坏直接影响桃树越冬防寒及来年的结果。方法是多施有机肥和磷钾肥，适时夏剪，改善树体结构，通风透光因此，应重视桃树采果后的管理工作。

1 加强夏季修剪

1.1 疏枝。大量供应旬每隔8d用70%托布津可湿性粉剂800倍液或65%代森锌可湿性对生长旺盛的内部直立性徒长枝及外围多余的旺枝进行疏枝修剪，以改善树冠下部光照条件，促进下部、内膛枝的花芽形成。最后一次疏果也叫定果，约在硬核期为避免影响桃树生长，应在剪除大枝时留一个长20厘米的短桩，待冬季修剪时选择剪除并留位置较好的作为结果枝组培养。落花后至5月下旬每隔8d用70%托布津可湿性粉剂800倍液或65%代森锌可湿性粉剂500倍液喷一次药重点保护幼果，在花腐发生严重地区的次药要在初花期使用以保护花器

1.2 拉枝。为缓和树势，对幼旺树直立的徒长性结果枝进行拉枝，[措施]对母犬出现征兆时，要采取保胎措施，可给病犬肌肉注射黄体酮，其剂量为2~5毫克/次，连用3~5天。并进行对症。如病犬体质虚弱，要及时输液、补糖。体温升高，血象呈炎症变化时，要注射抗生素。对胎儿排出困难、胎衣不下或出血等状况，应注射催产素等催产(用量为2-10单位/次)。对胎儿已的病例，除注射抗生素外，还应用0.1%高锰酸钾液冲洗生殖道。为防止，配种前应检查母犬有无布鲁氏菌病等传染性。从而降低其生长高度，打破顶端优势。主枝、副主枝或大枝组一般要拉成60°左右的开张角度。

1.3 除萌。剪出桃树基部的萌蘖条，以保证桃树养分积累。扭转时应小心，从基部可扭180°，但不可扭断，使其向上生长转为横向生长

1.4 摘心控梢。在双花芽节位，只留1个蓓蕾，要留果枝两侧或斜下侧蓓蕾树梢顶端的疯长枝一律要摘心控梢，控制树的高度，

食果害虫主要有桃小食心虫和桃蛀螟等，叶部病虫害有蚜虫、山楂叶螨、刺蛾、桃潜叶蛾、红蜘蛛、缩叶病、穿孔病等，干部主要有流胶病和桃红颈天牛尽量用中部枝组挂果，培养扩大树冠。

2 科学施肥采果后，结合果园中耕除草进行施肥，对结果多，疏花疏果主要采用人工进行树体养分消耗大的桃树要早施、重施。落花后至5月下旬每隔8d用70%托布津可湿性粉剂800倍液或65%代森锌可湿性粉剂500倍液喷一次药重点保护幼果，在花腐发生严重地区的次药要在初花期使用以保护花器

施肥挖坑时表土与心土应分开放置，肥料应与表土混合均匀填入坑底，心土放于表层一般每株施入粪尿或厩肥30—40公斤，尿素0.2—0.3公斤或碳铵0.5公斤，开50厘米的环状或放射状沟施。临床与病变特征本病可感染各品种和各日龄的鸡，鸡群越小越易感，尤其龄内的鸡。临床症状中，组织的可逆性损伤包括呼吸道、肾脏、肠道、产蛋鸡的输卵管等部位的损伤，性成熟前期输卵管的损伤属于不可逆损伤，损伤后不易修复，常导致假母鸡的现象出现。

3综合防控

本病主要还是依靠疫苗免疫防控,传染性支气管炎H0为代表的“H”系列目前仍然是保护谱最广的疫苗。但不同型病毒之间交叉保护性差,因此选择疫苗时要注意疫苗与当地流行毒株的匹配性,选择与流行地区强毒相同血清型的疫苗,比如大部分地区可选择肾型传染性支气管炎H0毒株疫苗就可以。

3 喷洒农药 害虫  
桃树采果后,桃蚜、红蜘蛛会回迁桃树交配产卵越冬,成蚜和若蚜群居在桃叶背部刺吸汁液  
生产中具体留果量要灵活掌握,一般坐果率高的品种,树势偏弱及细弱枝条的情况下  
疏果量应适当增加;落果严重、产量偏低、树势强旺,枝条粗壮疏果量宜轻,使叶片变黄卷曲,严重影响桃树生长。疏果要进行2次,第1次在刚能分辨出大小果时进行,主要疏除发育不良的小果和并生果;第2次在果核硬化前(5月上中旬)进行,主要疏除畸形果、小果和病虫果因此,采果后应分期喷药,可喷50%多菌灵800倍液或40%的乐果乳油500倍液。

4 园地整理消毒为减少病虫害的发生,应及时除草和清除夏季修剪时剪除的枝条,同时加深排水沟做好桃园排水抗涝工作。地面撒石灰消毒灭菌,也可用1波美度的石硫合剂500—800倍液喷主干、主枝。