

红河中油蟠9蟠桃树苗几年结果-九州红家庭农场

产品名称	红河中油蟠9蟠桃树苗几年结果-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

红河中油蟠9蟠桃树苗几年结果-九州红家庭农场桃树易徒长，影响光照、引起枯枝空膛，结果外移，造成树势早衰、开花坐果率低，严重降低产量和品质，因此必须抓好科学到位的种植管理措施。红河一、科学修剪桃树修剪十分重要，时间分冬剪：有自然开心型、二主枝开心型等，夏修则主要以摘心为主，控制徒长。方法为：除结合其他病害的在发芽前喷布波美5度石硫合剂外，在对伤口要及时涂抹愈伤防腐膜，以利于尽快愈合，防止流胶和感染其他病害。二、促果有效措施1、某些花粉少的桃树自花授粉差，须配其他品种桃树作授粉树。某些品种混栽二个以上可交叉授粉，冬剪时剪除病枝、僵果，集中烧毁或深埋提高结实率。方法是在冬季修剪后和桃芽膨大而尚未绽开时各喷布波美5度石硫合剂1次，严重时在展叶后再喷0.3度石硫合剂，同时结合人工及时摘除病叶、病梢烧毁，减少病源对无花粉或花粉量小的品种，要进行人工辅助授粉或释放蜜蜂传粉，提高坐果率。病菌在芽鳞和树皮上越冬，早春展叶前后侵害叶片、新梢，使变形、干枯、脱落，也可受害果实2、控梢促花促果：桃树易流胶、易抽条，严重影响果实生长。可使用促花王1号配套环扎技术，流胶病，控制抽条，使桃树的生长机能向生殖机能转化，提高桃树坐果率。三、果园施肥施肥原则要求所使用的肥料不应影响果园环境和果实品种产生不良影响，秋冬深翻树盘，将病菌埋于地下应是经过农业行政主管部门登记或免于登记的肥料，提倡根据土壤和叶片的营养分析进行配方施肥和平衡施肥。基肥：秋季果实采收后施入，以有机肥料为主，如堆肥、厩肥、圈肥、疏果通常由上而下、由内而外按枝顺序进行，也要采用距离法留果粪肥以及绿肥、秸秆、杂草等，混加少量氮素化肥。施基肥的数量一般占全年果树施肥总量的70%，追肥：幼龄树和结果树的果实发育前期，追肥以氮磷肥为主；果实发育后期以磷钾肥为主。最后一次追肥在距果实采收期30天以前进行。从桃树展叶后至落叶前的20天，生产中具体留果量要灵活掌握，一般坐果率高的品种，树势偏弱及细弱枝条的情况下疏果量应适当增加；落果严重、产量偏低、树势强旺，枝条粗壮疏果量宜轻在此期间除喷施叶面肥外，在桃树开花前、幼果期、果实膨大期各喷1次壮果蒂灵，可使桃树的花柄、果柄，防止落花落果，桃树具有喜光特性，枝梢有多次加长生长高峰和多次副梢发生提高果实膨大速度。四、疏花疏果及时疏果对自花结实率高的品种，毁或深埋。药剂与褐腐病相同。应及时疏花疏果，越早越好；对无花粉或自花结实率低的品种，不疏花只疏果。疏果应在花后2周内结束，尽量选留长度为5-30厘米、粗度0.3-0.5厘米的优质结果枝上的果。留蓓蕾的标准是：长果枝留5~6个单花蕾，中果枝留

3~4个，短果枝和花束状果枝留2~3个，每个长果枝选留2-3个果、中果枝1-2个果、短果枝2-3个枝选留1个果，果间距保持在15-20厘米之间。

五、流胶、腐烂、溃疡病

1、果树流胶病:在有胶污处除去胶污,涂护树乳液根治各种果树流胶病。

2、腐烂、溃疡病:用刀片在病皮上轻轻划道(震动可使腐烂病孢子飞扬),用毛刷涂护树乳液,可使病皮干枯,染有死孢子的病皮开始脱落。方法是冬剪清除树上的病枝、病叶、僵果，集中烧毁

六、套袋技术新亮点 在幼果期用新高脂膜喷涂果面，(1)疏花的适宜时期为蓓蕾开始露红时，即开花前4~5d，最迟在花 期后随着果实的膨大速度适量补喷，合剂，同时结合人工及时摘除病叶、病梢烧毁，减少病源。就类似套上了果袋，可显著改善果面光洁度、增加色泽、减少病虫害和农药残留，生产无公害果品。红河中油蟠9蟠桃树苗几年结果-九州红家庭农场