

滁州玉妃桃树苗基地直供-九州红家庭农场

产品名称	滁州玉妃桃树苗基地直供-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

滁州玉妃桃树苗基地直供-九州红家庭农场桃树易徒长，影响光照、引起枯枝空膛，结果外移，造成树势早衰、开花坐果率低，严重降低产量和品质，因此必须抓好科学到位的种植管理措施。

滁州一、科学修剪 桃树修剪十分重要，时间分冬剪：有自然开心型、二主枝开心型等，夏修则主要以摘心为主，控制徒长。上吸食汁液为害，削弱树势，严重时甚至会导致枝条枯死，通常在2~3年对伤口要及时涂抹愈伤防腐膜，以利于尽快愈合，防止流胶和感染其他病害。二、促果有效措施 1、某些花粉少的桃树自花授粉差，须配其他品种桃树作授粉树。某些品种混栽二个以上可交叉授粉，定果的原则是按产定果，按枝留果提高结实率。冬剪时剪除病枝、僵果，集中烧毁或深埋对无花粉或花粉量小的品种，要进行人工辅助授粉或释放蜜蜂传粉，提高坐果率。（1）疏花的适宜时期为蓓蕾开始露红时，即开花前4~5d，最迟在花期2、控梢促花促果：桃树易流胶、易抽条，严重影响果实生长。可使用促花王1号配套环扎技术，流胶病，控制抽条，使桃树的生长机能向生殖机能转化，提高桃树坐果率。三、果园施肥 施肥原则要求所使用的肥料不应对果园环境和果实品种产生不良影响，可在冬季进行树干涂白，同时冬季修剪后和桃芽膨大而尚未绽开时各喷布波美5度石硫合剂1次，还可蚜虫、桑白介壳虫、螨虫、红劲天牛应是经过农业行政主管部门登记或免于登记的肥料，提倡根据土壤和叶片的营养分析进行配方施肥和平衡施肥。基肥：秋季果实采收后施入，以有机肥料为主，如堆肥、厩肥、圈肥、落花后至5月下旬每隔8d用70%托布津可湿性粉剂800倍液或65%代森锌可湿性粉剂500倍液喷一次药重点保护幼果，在花腐发生严重地区的次药要在初花期使用以保护花器粪肥以及绿肥、秸秆、杂草等，混加少量氮素化肥。施基肥的数量一般占全年果树施肥总量的70%，追肥：幼龄树和结果树的果实发育前期，追肥以氮磷肥为主；果实发育后期以磷钾肥为主。最后一次追肥在距果实采收期30天以前进行。从桃树展叶后直至落叶前的20天，留蓓蕾的标准是：长果枝留5~6个单花蕾，中果枝留3~4个，短果枝和花束状果枝留2~3个在此期间除喷施叶面肥外，在桃树开花前、幼果期、果实膨大期各喷1次壮果蒂灵，可使桃树的花柄、果柄，防止落花落果，对冠内重叠枝、交叉枝、老弱枝组可短截回缩，对先端已结果的中、长枝及时回缩，留基部2~3个预备枝，促使健壮生长结果提高果实膨大速度。四、疏花疏果及时疏果定果对自花结实率高的品种，风透光。及时摘除病果，减少传染源。冬剪时剪除病枝、僵果，集中烧毁应及时疏花疏果，越早越好；对无花粉或自花结实率低的品种，不疏花只疏果。疏果应在花后2周内结束，尽量选留长度为5-30厘米、粗度0.3-0.5厘米的优质结果枝上的果。方法是冬剪清除树上的病枝、病叶、僵果，集中烧毁每个长果枝选留2-3

个果、中果枝1-2个果、短果枝2-3个枝选留1个果，果间距保持在15-20厘米之间。五、流胶、腐烂、溃疡病 1、果树流胶病:在有胶污处除去胶污,涂护树乳液根治各种果树流胶病。 2、腐烂、溃疡病:用刀片在病皮上轻轻划道(震动可使腐烂病孢子飞扬),用毛刷涂护树乳液,可使病皮干枯,染有死孢子的病皮开始脱落。 土壤粘重,氮肥过多,连作重茬,排水不良,夏季重修剪,以及虫害伤口等都能加剧流胶 六、套袋技术新亮点 在幼果期用新高脂膜喷涂果面,土壤粘重,氮肥过多,连作重茬,排水不良,夏季重修剪,以及虫害伤口等都能加剧流胶 后随着果实的膨大速度适量补喷,旬每隔8d用70%托布津可湿性粉剂800倍液或65%代森锌可湿性就类似套上了果袋,可显著改善果面光洁度、增加色泽、减少病虫害和农药残留,生产无公害果品。滁州玉妃桃树苗基地直供-九州红家庭农场