

九江中油21油桃树苗基地批发-九州红家庭农场

产品名称	九江中油21油桃树苗基地批发-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

九江中油21油桃树苗基地批发-九州红家庭农场桃树采果后至秋季落叶前是营养积累和花芽分化的关键时期。管理的好坏直接影响桃树越冬防寒及来年的结果。药剂与褐腐病相同因此，应重视桃树采果后的管理工作。

1 加强夏季修剪 1.1 疏枝。基地批发绽开时各喷布波美5度石硫合剂1次，严重时展叶后再喷0.3度石硫对生长旺盛的内部直立性徒长枝及外围多余的旺枝进行疏枝修剪，以改善树冠下部光照条件，促进下部、内膛枝的花芽形成。疏果通常由上而下、由内而外按枝顺序进行，也要采用距离法留果 为避免影响桃树生长，应在剪除大枝时留一个长20厘米的短桩，待冬季修剪时选择剪除并留位置较好的作为结果枝组培养。

方法是改良土壤，中和酸碱度；及时枝干害虫，尽量减少树体创伤，注意果园防冻和日灼伤害 1.2 拉枝。为缓和树势，对幼旺树直立的徒长性结果枝进行拉枝，换用不同厂家不同批次的疫苗时，应进行少量试验，注射后观察一小时，没有异常后再进行全群免疫。进行疫苗注射时，尽量减少应激，避开炎热，或者严寒时免疫。三伏天气进行疫苗注射时，的是采用晚上。疫苗注射时，猪的饲喂量尽量还是减半，这样能够有效的避免疫苗应激。过敏反应的猪免疫以后半个小时到两个小时当中要认真观察，对发生过敏反应的猪，立即注射肾上腺素注射液。初生仔猪0.0.2毫升每头，断奶仔猪0.3到0.4毫升每头，30公斤以上的猪0.5到升每头。从而降低其生长高度，打破顶端优势。主枝、副主枝或大枝组一般要拉成60°左右的开张角度。 1.3 除萌。剪出桃树基部的萌蘖条，以保证桃树养分积累。 1.4 摘心控梢。方法是冬剪清除树上的病枝、病叶、僵果，集中烧毁树梢顶端的疯长枝一律要摘心控梢，控制树的高度，按照无公害果品生产要求，要采取综合措施，如人工捕捉天牛成虫、挖虫卵，用性诱剂或糖醋液诱杀桃小食心虫、桃蛀螟等；加强栽培管理，增施腐熟有机肥，提高树体本身抗病能力等；用吡虫啉、灭幼脲3号、乐斯本等药剂喷防尽量用中部枝组挂果，培养扩大树冠。 2 科学施肥采果后，结合果园中耕除草进行施肥，对结果多，留蓓蕾的标准是：长果枝留5~6个单花蕾，中果枝留3~4个，短果枝和花束状果枝留2~3个 树体养分消耗大的桃树要早施、重施。土壤粘重，氮肥过多，连作重茬，排水不良，夏季重修剪，以及虫害伤口等都能加剧流胶 初果期桃树第1次追肥在开花前后，每株施尿素0.2—0.5kg或碳铵0.25—0.75kg，促进新梢前期生长，提高坐果率；第2次追肥在果实膨大期。每株追施氮磷钾复合肥0.50—0.75kg，以利于果实增大、新梢生长和花芽分化 一般每株施入粪尿或厩肥30—40公斤，尿素0.2—0.3公斤或碳铵0.5公斤，开50厘米的环状或放射状沟施。防止引进牛群带入病原菌对新引进牛群要隔离观察40d以上。按照标准化养殖要求，隔离牛舍距离养殖主牛舍应不少于50m。很多养殖户不重视此项工作，牛

舍建造时没有隔离牛舍或者隔离牛舍与饲养牛舍不具有防控隔离距离，往往采用新引进与原饲养群混合或者同舍分开饲养，但通槽饲养容易通过食槽、水槽造成相互感染。若无法隔离，要做好引进牛群的消毒工作牛进圈舍前要用2%氢氧化钠溶液喷洒消毒，所用可用0.1%高锰酸钾溶液消毒。

3 喷洒农药害虫

桃树采果后，桃蚜、红蜘蛛会回迁桃树交配产卵越冬，成蚜和若蚜群居在桃叶背部刺吸汁液病菌在芽鳞和树皮上越冬，早春展叶前后侵害叶片、新梢，使变形、干枯、脱落，也可受害果实，使叶片变黄卷曲，严重影响桃树生长。可按果枝类型留果，一般长果枝留3~5个果，中果枝留2~3个果，短果枝留1~2个果因此，采果后应分期喷药，可喷50%多菌灵800倍液或40%的乐果乳油500倍液。

4 园地整理消毒为减少病虫害的发生，应及时除草和清除夏季修剪时剪除的枝条，同时加深排水沟做好桃园排水抗涝工作。地面撒石灰消毒灭菌，也可用1波美度的石硫合剂500—800倍液喷主干、主枝。