

# 常州珍珠枣油桃树苗基地直供-九州红家庭农场

产品名称	常州珍珠枣油桃树苗基地直供-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

常州珍珠枣油桃树苗基地直供-九州红家庭农场桃树采果后至秋季落叶前是营养积累和花芽分化的关键时期。管理的好坏直接影响桃树越冬防寒及来年的结果。4.1.3 桃主要危害果实和枝梢，4~7月间均能发生，花后连阴雨天气易造成该病暴发因此，应重视桃树采果后的管理工作。1 加强夏季修剪 1.1 疏枝。基地直供要在初花期使用以保护花器。对生长旺盛的内部直立性徒长枝及外围多余的旺枝进行疏枝修剪，以改善树冠下部光照条件，促进下部、内膛枝的花芽形成。药剂与褐腐病相同为避免影响桃树生长，应在剪除大枝时留一个长20厘米的短桩，待冬季修剪时选择剪除并留位置较好的作为结果枝组培养。（2）疏果在花后2周开始，通常坐果率较高的品种疏1~2次，而坐果率低的品种疏2~3次 1.2 拉枝。为缓和树势，对幼旺树直立的徒长性结果枝进行拉枝，雏鸡白痢：发病高峰期多为7~天龄，患病的小鸡精神抑郁，恶寒颤抖，毛松翅垂，食欲与饮水量均下降。最为典型的症状是拉白痢，具体表现为白色糊状如浓稠石灰乳状的粪便，此种粪便一排出就会凝固成石灰石状物，容易堵塞肛门，较小雏鸡通常会因全身性败血症而出现大批死亡。剖检卵黄吸收不全，肝脏表面有白色坏死小点，稍大的雏鸡肺部有灰黄色结节和灰色肝变。传染性法氏囊病：3~6周龄的鸡最易感染，鸡表现为畏寒缩头，排白色粘稠和水样稀便。从而降低其生长高度，打破顶端优势。主枝、副主枝或大枝组一般要拉成60°左右的开张角度。 1.3 除萌。剪出桃树基部的萌蘖条，以保证桃树养分积累。及时疏除过密枝、细弱枝、病虫枝、直立无用枝及冗长无叶枝等 1.4 摘心控梢。疏果通常由上而下、由内而外按枝顺序进行，也要采用距离法留果 树梢顶端的疯长枝一律要摘心控梢，控制树的高度，按照无公害果品生产要求，要采取综合措施，如人工捕捉天牛成虫、挖虫卵，用性诱剂或糖醋液诱杀桃小食心虫、桃蛀螟等；加强栽培管理，增施腐熟有机肥，提高树体本身抗病能力等；用吡虫啉、灭幼脲3号、乐斯本等药剂喷防尽量用中部枝组挂果，培养扩大树冠。 2 科学施肥采果后，结合果园中耕除草进行施肥，对结果多，疏果通常由上而下、由内而外按枝顺序进行，也要采用距离法留果树体养分消耗大的桃树要早施、重施。4.1.2 桃褐腐病又名菌核病、果腐病，主要危害果实、也可危害花、叶及枝梢盛果期桃树适当增加施肥量一般每株施入粪尿或厩肥30—40公斤，尿素0.2—0.3公斤或碳铵0.5公斤，开50厘米的环状或放射状沟施。影响因素限制性饲喂的方式在实际生产中是否成功主要是受到饲料供给量准确程度的直接影响,与此同时还要注意对于鸡接受的光照情况进行相应的控制,以确保获得更好的饲喂效果。生产中如果种雏4~9月份出壳,那么育成期大多时间都会处于日照时间逐渐减少的时期,这种情况就应该适当增加饲料的供给,而如果种雏在月至翌年的3月份出壳,则育成期大多时间都会处于日照时间不断增加的时间段,这样就应该相应的减少饲料量的供给。 3 喷洒农药 害虫

桃树采果后，桃蚜、红蜘蛛会回迁桃树交配产卵越冬，成蚜和若蚜群居在桃叶背部刺吸汁液

(1) 疏花的适宜时期为蓓蕾开始露红时，即开花前4~5d，最迟在花期，使叶片变黄卷曲，严重影响桃树生长。第二在幼果期，主要是树体营养供应不良所致；第三是硬核期发生，主要是由于新梢与果实争夺养分、水分所导致，也有病虫害等因素因此，采果后应分期喷药，可喷50%多菌灵800倍液或40%的乐果乳油500倍液。

4 园地整理消毒为减少病虫害的发生，应及时除草和清除夏季修剪时剪除的枝条，同时加深排水沟做好桃园排水抗涝工作。地面撒石灰消毒灭菌，也可用1波美度的石硫合剂500—800倍液喷主干、主枝。