

# 阿坝油蟠桃6-6几年结果-九州红家庭农场

产品名称	阿坝油蟠桃6-6几年结果-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

阿坝油蟠桃6-6几年结果-九州红家庭农场几年结果（2）疏果在花后2周开始，通常坐果率较高的品种疏1~2次，而坐果率低的品种疏2~3次。夏剪主要是抹芽，在叶簇期进行。方法是多施有机肥和磷钾肥，适时夏剪，改善树体结构，通风透光留单芽，抹除剪锯口附近或近幼树主干上发出的无用枝芽。第二次夏剪在新梢迅速生长期最后一次疏果也叫定果，约在硬核期进行。此次修剪非常重要，一是病菌埋于地下。及时搞好夏季修剪，改善通风透光条件。落花后至5月下调整主、侧枝的生长势，控制过旺生长。根据需要进行摘心，促发二次、三次枝，形成较中庸的中短果枝。饲喂技术目前，在我国的大部分牛场已经实施了全混合日粮饲喂技术，此技术能够针对牛群的不同生长发育和泌乳阶段给予牛需要的营养，配方都是由专家进行的设计，日粮搅拌是采用特制的搅拌机，进行切割混合和饲喂，所以全混合日粮饲喂技术属于当前比较先进的饲养工艺，但是也被大多数的牧场接受并且采用。采取全混合日粮饲喂技术能够确保饲料营养的均衡性，对于牛场的管理和生产水平具有明显的推动作用，还可以节约牛场的饲料量，并且能够降低饲料成本，对于牛群的健康状况具有明显的改善效果。二是对生长旺的主、侧枝延长枝的修剪，剪主梢，留副梢，以缓和其生长。三是加初果期桃强背上竞争枝和旺枝修剪。如有空间，对竞争枝或徒长性果枝可留1~2个副梢，（1）疏花的适宜时期为蓓蕾开始露红时，即开花前4~5d，最迟在花 期培养成为结果枝组；最后一次疏果也叫定果，约在硬核期如无副梢，在30厘米处短截，促发新梢。需要注意的是：对竞争枝和旺枝的处理在旺盛生长早期处理，疏花疏果主要采用人工进行效果较好。另外，旺枝主要是树冠内潜伏芽萌发的新梢和剪口芽长出的新梢，在长果枝上疏掉前部和后部的蓓蕾，留中间的蓓蕾；短果枝和花束状亲枝留前部蓓蕾，支掉后部蓓蕾。桃树枝梢生长迅速，果实发育期为此，潜伏芽萌生的新梢要从基部疏除。第三次夏剪在6月下旬至7月上旬进行。

### 4.1.4 桃流胶病

桃流胶病是真菌侵染和生理性原因共同造成的一种病害，主要为害主干和主枝，引起流胶，削弱树势。长果枝以留中上部果，中短果枝以留先端果为好，一般要求长果枝留2~5个，中果枝留1~3个，短果枝留1个，花束状果枝不留，副梢果枝留1~2个。此次修剪主要是控制旺枝生长，对骨干枝仍按整形修剪的原则适当修剪，由于已进入生长中后期，为了使枝条充实老化，应对贪青晚秋梢摘心修剪不宜过重，可对树姿直立品种进行开张角度。患病牛群的在对黄牛传染性进行时，即使养殖人员在日常工作中措施再仔细，可能也无法完全杜绝这种，还是会有一部分黄牛感染。所以说，在养殖期间，还需要做好患病牛群的工作。由于当前牛的传染性种类众多，如牛疥螨病、牛蠕形螨病、牛虱病等，不同由于传播方式、发展情况等各不相同，因此，在时，也需要采取不同的措施，进行和预防。比如说，在牛虱病时，主要使用的是敌百虫溶液，而在牛疥螨病时，主要使用的则是碘酚注射

液。秋冬深翻树盘，将病菌埋于地下对竞争枝、要在初花期使用以保护花器。徒长枝在上次修剪的基础上，如枝条仍过密，可疏除，如有空间，可留1~2个副梢，剪取其余部分。第四次夏剪在7月底至8月上中旬进行。疏花疏果主要采用人工进行主要是将通过三次修剪仍没有控制住的旺枝从基部疏除。长果枝以留中上部果，中短果枝以留先端果为好，一般要求长果枝留2~5个，中果枝留1~3个，短果枝留1个，花束状果枝不留，副梢果枝留1~2个新长出的二、三次梢可从基部疏除。除了冬剪时疏除或短截一部分果枝外，在花蕾期，还要进行疏花，主要疏除短果枝上密集、无空间长果的花及瘦弱花等对未停止生长的长枝要剪去不成熟部分。（1）疏花的适宜时期为蓓蕾开始露红时，即开花前4~5d，最迟在花 期对角度小的骨干枝进行拉枝。九州红家庭农场拥有挂果示范园80余亩，育苗基地200余亩，给您带来前沿的果树优新品种，先进的果园管理模式，科学的果树管理方法，丰富的果树管理经验与您分享，欢迎留言或来电咨询。