

# 郑州京红青年鸡报价郑州京红青年鸡厂家郑州京红青年鸡供应

产品名称	郑州京红青年鸡报价郑州京红青年鸡厂家郑州京红青年鸡供应
公司名称	鹤壁市山城区常盛蛋鸡青年鸡养殖场
价格	14.00/只
规格参数	产蛋率:90%以上 开产:120日龄 均匀度:85%
公司地址	山城区鹿楼乡汪流涧村1号院
联系电话	17530398763

## 产品详情

### 蛋雏鸡 35 天定终生

蛋雏鸡群在 35 天的时候，其平均体重和均匀度能否达到标准，与性成熟日龄、产蛋持久性、终生产蛋数量均呈正相关，若鸡群 80%以上能够达到标准体重，则种鸡具备的产蛋性能等遗传潜力就能充分发挥；意味着\*\*系统发育完善，\*\*后能够产生良好的\*\*应答，机体的抗\*力强、死淘率低，故有 35 天定终生之说。 郑州京红青年鸡报价郑州京红青年鸡厂家郑州京红青年鸡供应

在 35 日龄的雏鸡空腹情况下，随机抽样称重，计算其平均体重和均匀度，标准为：褐羽鸡体重 380~400 克，灰羽鸡体重 360 克，白羽鸡体重 325~350 克，均匀度 80%以上。

但目前，由于使用的雏鸡饲料营养普遍较低，饲养密度大，35 天前的频繁\*\*、管理不当等原因，35 天的体重多数不达标，为了确保 35 天的体重达标，我们就要做好如下工作： 1.营养。确保蛋白 19%，能量 2900 大卡/公斤以上，钙 0.9%，有效磷 0.37%，赖氨酸 1.05%，蛋氨酸

0.45%，对于使用优质预混饲料的，百斤料加 5~10 克维生素

C(高温保育阶段温度高，机体合成与利用维生素 C

的能力下降，而预混料中一般不含有该项维生素，需要另外添加)，加优质植物油 1%~1.5%，7

天前加赖氨酸 25 克(7

天前雏鸡赖氨酸的需要量较高，而采食量过低，需要额外补充)。按照推荐配方调配饲料的，可以满足 35

天的营养要求。 郑州京红青年鸡 2.雏鸡安置。雏鸡按预定的时间到达育雏鸡舍，按照预定的方案，

尽快将雏鸡放入笼内(标准：1 周龄内，平养 20~30 只/平方米；网养 30 只/平方米；笼养 50~60

只/平方米)。装鸡时，笼养育雏根据进鸡多少，采用从上到下的装鸡原则，一般先装上 2

层。要将弱的鸡挑出单独饲，冬季放在较暖和的上层，夏季放在通风良好的中下层。 郑州京红

3.开食。从开食算起，至少 12 小时内不喂配合料，喂水拌的小米或玉米糝，要少喂勤添。建议从第二天起使用优质预混料或蛋雏鸡专用饲料，要在原配方基础上，另外加入

10%~15%玉米糝，以提高能量，促进卵黄吸收，防止消化不良性下痢，否则 35

天体重不易达标。从第三天开始喂高能、高蛋白的饲料，直至 35

天，严禁使用肉雏鸡颗粒饲料饲喂蛋雏鸡。在饲喂次数上，头 3 天每间隔 2 小时喂料 1 次；4~7 天间隔 3

小时喂料1次；2周龄内每日饲喂4~6次；3周自由采食。 郑州青年鸡 4.饮水。鸡雏入舍后稍休息10~20分钟可饮水。若开始用乳头饮水器，七天内亦必须增用钟式小型饮水器。从\*天起，鸡始终都要饮用16~19℃的水或深井凉水，要加3%~5%葡萄糖，多维适量饮水1~2天，加保健药物3~5天，夜间可换成清水，不加药物。饮水器装1/3的水，京红青年鸡每天换水4~6次，确保饮水温度不超过24℃，早期换水\*好6次，以保持水的清洁与低温。注意观察饮水器的水位，水位要充足，以无等待饮水鸡只为准，不可断水；水槽等的高度要合适，并随着鸡的日龄及时调整。水是\*重要\*廉价的营养物质。 郑州青年鸡 5.温度、湿度。温度35~37℃，必须保持昼夜的温度恒定，昼夜温差不超过2℃；每周下降温度2~3℃，温度下降要循序渐进，5周温度恒定在26~28℃。用地面洒水、火炉上放置水盆或水壶的方式产生水蒸气，进而提高鸡舍湿度，要确保湿度在前3天不低于65%，4~10天不低于60%。

青年鸡 6.通风。进雏当天以保温为主，通风为辅，可适当采取间歇性通风，采取机械通风，通风前升高舍温2~3℃，取暖炉的进风口设置在室外，防止氧气不足。育雏期间亦必须保持舍内空气新鲜，无贼风，否则易患马立克、慢性呼吸道疾\*、传染性支气管炎。生长缓慢，严重影响\*\*应答及以后的生产性能。 京红 7.养殖密度及采食器具准备。按采食位置计算，确保采食位置达到7天内2.5厘米/只，8~15天3厘米/只，15天以后3.5厘米/只。按照标准准备采食器具，确保雏鸡能够同时吃到饲料，增加鸡的均匀度。 郑州青年鸡 8.光照。前3天光照时间达24小时，3~7天22小时，第二周20小时，第三周18小时，从22天起至17周把期间\*长时间光照固定为此阶段光照。光照强度为\*周5~7瓦/平方米，第二周至第九周3~4瓦/平方米，十周后1.5~2瓦/平方米。灯泡离地面1.8米左右，灯不可离鸡太近，否则容易啄肛。灯泡的亮度要均匀，应交错悬挂，间隔3米左右。如果底层光照不够强，可以在距离下层50厘米的高度补充光照。 郑州京红青年鸡 9.消毒、卫生。从第三天开始带鸡消毒，每天早晚各一次，每周更换消毒。每天要打扫过道，保持清洁，从第四天开始每天清粪一次。弱毒苗\*\*当天不能带鸡消毒，夜间用次氯酸钠对地面进行消毒。 郑州青年鸡 10.断喙。5~9天断喙，断喙早比晚好，上断1/2，下断1/3。断喙要选择经验丰富的人来操作，要一次断好，绝不修理。断喙后饲料加厚，使鸡容易采食；加强管理，防止继发疾\*；生长发育不良、体弱\*鸡不能断喙；断喙操作要慢，要稍微停留，确实断好。饮水中加入维生素K3和其他广谱抗菌药3天。不支持与疫苗同时进行。 郑州京红青年鸡 11.补充粗沙粒等促进消化。鸡没有牙齿，从第十五天起要在饲料中加入大小适中的粗沙粒等，添加比例为千分之三，以促进肌胃对饲料的研磨，促进饲料利用和吸收。 京红青年鸡厂家

## 青年鸡科学养殖十二不宜

一、不宜与鸭、鹅混养。有的农户为节省场地，把鸡、鸭、鹅关在一起混养，这是不科学的。一是混养易造成疫\*的互相传播，如鸭、鹅也能感染新城疫\*毒，在一般情况下，\*毒潜伏于鸭、鹅体内成为带毒者，不表现任何症状。若与鸡混养在一起，\*\*易将\*毒传染给鸡，导致鸡发生新城疫。二是鸡鸭鹅混养在一起，会使饲料利用率降低，因它们对饲料的营养需要不一样，如果同喂一种饲料，必然造成饲料利用率降低，浪费饲料。三是鸭鹅叫声大，而鸡喜欢安静，如果混养在一起，鸡受惊吓而影响产蛋量。四是鸭鹅为水禽，喜水，而鸡喜干燥，在饲养场地潮湿的情况下鸡易发\*，所以三者不宜混养。 京红青年鸡厂家 二、鸡舍不宜用红光灯。红光灯会抑制发育阶段的雏鸡和青年鸡的生长，推迟其性成熟，导致开产晚；红光灯能使种公鸡的性功能受抑，使种蛋受精率低。所以雏鸡、青年鸡和生产种蛋的鸡舍内不要安装红光灯。

三、酒糟不宜喂鸡。鸡无齿，肠道短，缺乏分解纤维素的酶。因酒糟中含有大量的粗纤维无法消化利用，直接影响其他饲料的吸收，引起消化不良。 京红青年鸡供应

四、饲养员不宜频换外衣。鸡习惯了饲养员衣服的颜色后，会产生亲切感。饲养员一进鸡舍，即引起鸡精神振奋，食欲增强，采食量增加。如果饲养员突然更换外衣颜色，鸡群会表现惊恐、骚动不安、食欲下降、采食减少。所以饲养员既不能频换外衣，也应尽量不让外人进入鸡舍，以免人为地造成减产。 郑州京红青年鸡厂家

五、补钙不宜喂生蛋壳。有的农户习惯于用生蛋壳喂鸡，目的是给鸡补充钙质，以促进生产和多产蛋，殊不知，作用适得其反。因为蛋壳内外常附有细菌和\*毒，鸡吃后易得胃肠\*或传染\*。

六、种蛋不宜用水洗。种蛋表面有一层胶质保护膜，防水分和\*菌入侵，若用水洗掉蛋壳保护膜，将降低种蛋品质，影响孵化率及雏鸡的成活率。故种蛋不宜用水洗，应在孵化前用新洁尔灭等消毒处理。

七、产蛋高峰不宜打预防针。鸡进入产蛋期，其机能的生理变化是有一定规律的，这时如给鸡注射疫苗或菌苗，会打乱其规律，使产蛋下降或引发呼吸道疾\*。再者，鸡在产蛋期没有一个安静的环境，给鸡打针会因受恐惧患应激综合症，导致产蛋减少，食欲下降。给鸡打预\*\*苗针\*好是在开产前或停产后进行。  
京红青年鸡供应

八、驱虫不宜用敌百虫。敌百虫为广谱兽用驱虫药，对猪牛羊等大家畜均安全有效，而鸡应禁用。原因是：敌百虫属于有机磷药物，鸡嗉囊内多为碱性环境。敌百虫在碱性液态中，可生成挥发性很强的敌敌畏，其毒力要比敌百虫大10倍以上。鸡服敌百虫后\*易导致中毒。鸡驱虫时可选用驱虫灵或左旋咪唑片，效果很好。

九、蚯蚓不宜直接喂鸡。蚯蚓是动物高蛋白饲料，但不宜直接喂鸡，因蚯蚓含有异刺线虫，易引起寄生虫\*的发生,应将蚯蚓加工处理成蚯蚓粉饲喂。

十、蛋鸡舍不宜用生石灰消毒。用生石灰消毒鸡舍，易引起鸡脚趾烧伤；啄食石灰进入胃肠易引起胃肠炎、水肿、溃疡以及呼吸道疾\*的发生。故蛋鸡舍不宜用生石灰消毒，可配成10% 20%的石灰乳液喷洒鸡舍。京红青年鸡厂家

十一、圈舍不宜垫草木灰。草木灰的主要成分是碳酸钾，与鸡粪混在一起容易起化学反应，生成氨气。直接刺激鸡的呼吸道，轻者可使鸡呼吸道分泌物增加，生长发育受阻，产蛋率下降，重者引起喉头水肿，出现坏死性支气管炎、肺出血等急性\*症，甚至造成死亡。

十二、蛋鸡不宜喂生骨粉。生骨粉未经高压处理，骨粉与骨胶结合在一起，若长期喂鸡会引起钙磷比例失调，导致生产力下降。