

洛阳京红青年鸡报价 洛阳60天京红青年鸡 洛阳京红青年鸡体重胫长达标

产品名称	洛阳京红青年鸡报价 洛阳60天京红青年鸡 洛阳京红青年鸡体重胫长达标
公司名称	鹤壁市山城区常盛蛋鸡青年鸡养殖场
价格	14.00/只
规格参数	产蛋率:90%以上 料蛋比:2.2 : 1 开产:120日龄
公司地址	山城区鹿楼乡汪流涧村1号院
联系电话	17530398763

产品详情

断喙是养鸡生产中一个重要的技术环节。断喙可以有效避免啄癖的发生，提高饲料的利用率，使鸡群生长发育一致，提高育雏率，有利于鸡只发挥良好的生产性能。洛阳京红青年鸡报价 洛阳60天京红青年鸡 洛阳京红青年鸡体重胫长达标

1 断喙时间通常断喙在 5~6 日龄时进行较好。此时鸡只小，便于操作，并且还可以有效防止早期啄癖的发生。一般来说，不提倡在雏鸡 1 日龄时进行断喙，因此时断喙会导致不必要的脱水和较大的应激，而且 1 日龄雏鸡的喙短小，不便于操作。同时，要求断喙的日龄也不宜过大，如有的养殖者选择在 1 月龄甚至更大日龄时进行断喙，这时喙部的血管和神经丰富，会使断喙难度增大，对鸡只造成过强的应激而严重影响其正常的生长发育。但是需要注意的是，在鸡群发*或接种疫苗以及温度过高等处于应激的状态下均不宜进行断喙，需等到鸡群恢复正常时才能进行断喙。另外，对处于产蛋期用于交配的公鸡以及患有啄癖的个别鸡只也要进行适当的断喙。洛阳京红青年鸡,洛阳60天京红,60天京红青年鸡,青年鸡体重,京红青年鸡

2 准备断喙前 2d 至断喙后 3d 这段时间内，应在饲料或饮水中加入适量的多种维生素（尤其是维生素 K3、维生素 C，在饮水中的浓度分别为 4g / L 和 20g / L），以利于止血和增加抗应激性。断喙前 6h 内，停止饲喂。为保证断喙效果，宜选用具有自动控制功能的带高温刀片的精确断喙器。在操作人员的要求方面，需要由经验的饲养员专人断喙，以防参差不齐。洛阳京红青年鸡3 断喙操作当断喙器的刀片温度达到 650~750 时，即可进行断喙操作。左手抓住鸡的腿部，右手大拇指放在鸡头的后部，食指放在咽下，稍用力压，使舌头向后缩回，避免伸到刀刃下而受伤。烧烙时间一般控制在 3s 以内，以使剪断的部位呈焦黄色为佳。严禁刀片温度过高和烧烙时间过长，因为这样会使喙部软化，甚至使舌尖变形，影响以后的生产性能。同时，也要求刀片温度不可过低，否则不能起到烧烙止血的效果。另外，还要求刀片要锋利，否则喙会被压碎而不是被快速切除。一般情况下，切除部位在上喙到鼻孔的三分之二、下喙的三分之一处。要求操作者技术熟练，

注意力应集中，手法敏捷，部位力求掌握准确，达到上下喙能够整齐闭合，避免出现“地包天”或“天盖地”的现象。个别鸡只在断喙后还会流血，所以要仔细观察断喙后的鸡群，对流血的可酌情重新烧烙止血。要组织好人力物力，保证在*短时间内完成断喙。通常而言，断喙速度保持在每分钟不低于15只。对一鸡舍内的鸡只进行断喙时，*多不能超过2d。夏季时，要在较为凉爽的时候进行，一般来说，要求环境温度不能高于27。洛阳60天京红在进行断喙操作时，不可过轻或者是过重。过轻，会使喙在切断后很快就恢复到原来的长度，而使育雏期或育成期出现啄癖的现象；过重，会对雏鸡造成毁灭性的伤害。所以，要求操作时一定要力求准确，一步到位，使对雏鸡造成的应激尽可能小。另外，还要求抓鸡动作要轻，不宜粗暴，以免造成更大应激。60天京红青年鸡4断喙后的护理由于断喙产生的疼痛等不舒适感会使雏鸡饮水、采食困难，所以应采取相应的技术措施，使断喙对鸡只产生的应激降低到*小限度，保证尽快康复：断水3h，避免断喙部位由于触水而造成出血；在饮水中加入恩诺沙星或其它抗生素，以防引起慢性呼吸道疾*和细菌感染（但需注意断喙前后两天内不能投喂磺胺类药物，因其会延长流血）；保证充足饮水；改用饮水杯或降低水压以改善饮水效果；饲喂粉料，且要求槽内饲料厚度3cm以上，直至痊愈；适当提高舍内的光照强度、延长光照时间；提高舍内温度2~3；尽量避免和减少抓鸡、转群、**等各种应激。京红青年鸡5修喙如果初次断喙效果不好，或断喙后喙长的不好，则需进行第二次断喙，即修喙。修喙可在5~8周龄时进行，以保证鸡只有充分发育的时间。操作方法与*次基本相同。如果鸡的日龄较大，则可用左手大拇指和食指握住翅膀根部，左手小拇指勾住鸡左侧小腿，右手保定头部，大拇指放在头部，食指放在咽喉部，施加适当压力使舌头回缩、上下喙闭合整齐。另外，在修喙时一定要注意避免烫伤鸡的舌头。京红青年鸡体重*后，还需切记，在生产中要争取断喙一次成功，尽量不用二次断喙，以减免对鸡产生的应激作用，并减少不必要的工作投入。

产蛋鸡管理阶段饲喂

根据鸡群的产蛋率和周龄，将产蛋期分为若干阶段，并根据环境温度，喂以不同水平的蛋白质、能量的日粮。这种既能够满足鸡的营养需要，又能够节约饲料的方法称为阶段饲喂。阶段饲喂分两阶段饲养法（即产蛋前期和后期）和三阶段饲养法（即产蛋前期、中期和后期），一般采用三阶段饲养法较科学合理。洛阳京红青年鸡

1、产蛋前期

如育成期鸡群管理得当，一般在20周龄左右开产，在28-32周龄产蛋率达90%左右，至40周龄仍可达80%以上，鸡蛋可由开产的40g增至40周龄时的56g以上，体重增加也很快，由原来1300g增至1700g。因此，产蛋前期是产蛋期的关键，对饲养技术的要求是使产蛋率迅速达到*高峰，并维持较长时间，所以要注意提高日粮的蛋白质、矿物质和维生素的含量。产蛋前期应给每只母鸡喂蛋白质18g/d、302kcal代谢能。京红青年鸡厂家

产蛋前期母鸡繁殖机能旺盛，代谢强度大，摄入的营养多于产蛋和增加体重，因此，鸡的抵抗力差，容易感染疾*，应加强卫生**，但不要进行**接种和驱虫，防止其他应激发生。洛阳京红青年鸡

2、产蛋中、后期

母鸡体重几乎不增加，产蛋率下降，但蛋重仍有增加，此时的饲养管理应使产蛋率缓和*平稳地下降，所以日粮中蛋白质水平可适当减少。

3、阶段饲喂应注意的问题

(1)开产后管理

开产后应尽快使母鸡达到应有的高峰和适量的蛋重，然后随产蛋量下降而降低日粮中的蛋白质水等，切忌因日粮的改变使产蛋量下降。洛阳京红青年鸡厂家

(2)开产后饲喂管理

要考虑日粮能量水平和环境温度对采食量的影响，如果饲喂的第三阶段处在夏季，此时便不宜降低日粮的蛋白质水平，因为夏季采食量会自然减少。

(3)要经常测定采食量

测定方法：如按天或顿供应料，当天词料吃完，则将当天的供料量除以存活母鸡数，就是当天的平均采食量。如采用贮料塔或贮料箱的机械供料，可在料塔装料全空后再装入一定数量饲料，全部吃完，统计饲喂天数，则可大致算出鸡群平均采食量。洛阳60天京红青年鸡