

宁玉草莓苗基地位置、宁玉草莓苗购买参考价格

产品名称	宁玉草莓苗基地位置、宁玉草莓苗购买参考价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	1.00/棵
规格参数	品种:草莓苗价格 产地:创隆园艺场 高度:30
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

宁玉草莓苗基地位置、宁玉草莓苗购买参考价格

草莓细菌性叶斑病的危害症状

在最开始发病的时候，是从叶子开始发病的。发病时，会发现叶片的下表面会出现一些水浸状红褐色的不规则病斑。等到这些病斑扩大了之后，因为受到细小叶脉的限制，所以会呈现角形的叶斑，因此这种病害称为角斑病或者是叶斑病。病斑的地方在照光时是透明状的，但是在反射光看的时候，会发现是深绿色的。等到发病严重的时候，这些病斑会越来越大，然后融为一体。慢慢的变成红褐色，然后变得干枯。

草莓细菌性叶斑病的发病因素

在高温多雨的季节时，是这种病害的多发期。其他的发病因素有：经常连作、地势非常低洼、灌溉的水量过多、排水没有做好、氮肥适量过多、人为造成的伤口等等，这些都是病害发病的因素。栽种地块要经常清理，把一些老叶子和染病的叶子以及枯的枝杈茎带离，地块里的乱草也要经常拔。这样可以把一些病类菌的源头清理掉，从而减少生病的概率。前面我们也说了，草莓发生炭疽类病大都是在温度高湿度又大的情况下，所以要注意补充水和遮挡太阳光。补充水时量不能太大，可以用少量多浇几回的方式补充。天气太热的时候注意使用遮阳的网子，这样能让温度下降一些。一旦发现有生病的苗头，要尽快使用相对的药水喷洒来防治。

草莓红梗的解决办法

首先要把温度做好控制，不能让温度忽然高、又忽然下降，起伏太大就会

出现草莓红梗这种情况。再有就是把湿度控好，让大棚里的湿度最好能维持在60%上下，能放风的时候尽量放风来排出去湿气。草莓花朵开放的阶段和刚结小草莓时，不要单独追加高钾素的肥，可以追加高氮素高钾素肥。等草莓果变成白颜色，就可以追加高磷素高钾素的肥。每间隔一段时间就要给草莓喷洒一些腐植酸，或者氨基酸之类的叶子面肥，不仅可以防止草莓果发僵，还能够加快它生长的速度，并且可以养根和护根。

病虫害的预防同样很重要，气温慢慢的变高，像是红蜘蛛虫子和蓟马虫子也就出现了，这一个阶段把预防的工作千万要做好。白昼的温度和晚上的温度要拉的大一点，这样可以使草莓果的成熟时间变得长一点，不仅可以使草莓果长得更大，还可以使它的甜蜜度更高。

有一点需要注意，已经出现了盐类害的大棚就不能继续用肥了。可以用一些水或者霉菌剂随水冲施一回到两回，等草莓长出新的叶子时再追加肥就可以了。有时草莓出现红梗是因为营养型生长不旺，移栽之后的缓苗速度很慢。这时草莓根的部位湿度太大，拔出来之后长出来的新根很少。要适当的给它增加一点温度，抑制补充水的量。等草莓的叶子长出来之后，再随水冲施一些生根用的肥。