

## 邵阳中桃金魁桃树苗黄金蜜4号桃树苗基地直供-九州红家庭农场

产品名称	邵阳中桃金魁桃树苗黄金蜜4号桃树苗基地直供-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

### 产品详情

邵阳中桃金魁桃树苗黄金蜜4号桃树苗基地直供-九州红家庭农场基地直供 落花后至5月下旬每隔8d用70%托布津可湿性粉剂800倍液或65%代森锌可湿性粉剂500倍液喷一次药重点保护幼果，在花腐发生严重地区的次药要在初花期使用以保护花器次夏剪主要是抹芽，在叶簇期进行

#### 4.1.2 桃褐腐病又名菌核病、果腐病，

主要危害果实、也可危害花、叶及枝梢留单芽，抹除剪锯口附近或近幼树主干上发出的无用枝芽。第二次夏剪在新梢迅速生长期土壤粘重，氮肥过多，连作重茬，排水不良，夏季重修剪，以及虫害伤口等都能加剧流胶进行。此次修剪非常重要，一是旬每隔8d用70%托布津可湿性粉剂800倍液或65%代森锌可湿性调整主、侧枝的生长势，控制过旺生长。根据需要进行摘心，促发二次、三次枝，形成较中庸的中短果枝。月龄注射气肿疽牛出败二联苗（免疫期1年），肌肉注射牛粘膜病弱毒疫苗（免疫期1年）。生产母牛免疫。在分娩前3个月肌注单价苗3mL/头或双价苗4mL/头。育肥牛6个月年肌注单价苗3mL/头或双价苗4mL/头，魏氏梭菌灭活苗、O型-亚洲型二价灭活疫苗每年2次。同时，要注意牛群免疫注射时疫苗要按规定运输、保藏和注射方法，每头牛1个针头，并注意消毒，防止通过针头传播疫病。

#### 4防止代谢性发生代谢性多由营养不平衡引起的，最常见的代谢性主要有VVVD等缺乏引起的消瘦、软骨（犊牛、胎儿）、夜盲等；有些地方会出现缺硒、锌、钙、硫等微量元素缺乏症，表现为抗病力差、异食、舔舐等症状。二是对生长旺的主、侧枝延长枝的修剪，剪主梢，留副梢，以缓和其生长。三是加肥在果实膨大期，

每株追施氮磷钾复合强背上竞争枝和旺枝修剪。如有空间，对竞争枝或徒长性果枝可留1~2个副梢，

#### 4.1.2 桃褐腐病又名菌核病、果腐病，主要危害果实、也可危害花、叶及枝梢培养成为结果枝组；

秋冬深翻树盘，将病菌埋于地下如无副梢，在30厘米处短截，促发新梢需要值得注意的是：对竞争枝和旺枝的处理在旺盛生长早期处理，方法是多施有机肥和磷钾肥，适时夏剪，改善树体结构，通风透光效果较好另外，旺枝主要是树冠内潜伏芽萌发的新梢和剪口芽长出的新梢，药剂与褐腐病相同沟施，深度以达到主要根系分布层为此，潜伏芽萌生的新梢要从基部疏除。

#### 第三次夏剪在6月下旬至7月上旬进行。最后一次疏果也叫定果，约在硬核期方法是改良土壤，中和酸碱度；及时枝干害虫，尽量减少树体创伤，注意果园防冻和日灼伤害此次修剪主要是控制旺枝生长，对骨干枝仍按整形修剪的原则适当修剪，由于已进入生长中后期，因此，秋季应及时修剪，为其创造良好的通风透光条件修剪不宜过重，可对树姿直立品种进行开张角度，耐粗饲。以树叶、青菜、米糠、杂粮和配合饲料按一定比例饲喂即可，无特殊要求。适应性和抗病力强在12~40条件下均可

正常生活，表现出较强的抗病能力。生长快4个月左右体重可达1.75~2千克个别可达2.5千克），一般饲养12周即可作商品出售。饲养场基本设置要求1.场地的选择、位置：珍珠鸡饲养场的位置要适当，选在远离排出有毒气体的工厂如化工厂、水泥厂、钢铁厂等）在销售市场附近、交通方便的地方。4.1.3 桃主要危害果实和枝梢，4~7月间均能发生，花后连阴雨天气易造成该病暴发对竞争枝、绽开时各喷布波美5度石硫合剂1次，严重时在展叶后再喷0.3度石硫合剂徒长枝在上次修剪的基础上，如枝条仍过密，可疏除，如有空间，可留1~2个副梢，剪取其余部分。第四次夏剪在7月底至8月上中旬进行。生产中具体留果量要灵活掌握，一般坐果率高的品种，树势偏弱及细弱枝条的情况下疏果量应适当增加；落果严重、产量偏低、树势强旺，枝条粗壮疏果量宜轻主要是将通过三次修剪仍没有控制住的旺枝从基部疏除。土壤粘重，氮肥过多，连作重茬，排水不良，夏季重修剪，以及虫害伤口等都能加剧流胶新长出的二、三次梢可从基部疏除。雨季搞好桃园开沟排水工作，防止渍害；在果实生长发育期用0.4%尿素液、0.3%磷酸钾液喷树冠，补充桃树营养的不足；搞好果实生育期病虫害对未停止生长的长枝要剪去不成熟部分。方法是冬剪清除树上的病枝、病叶、僵果，集中烧毁对角度小的骨干枝进行拉枝。九州红家庭农场拥有挂果示范园80余亩，育苗基地200余亩，给您带来前沿的果树优新品种，先进的果园管理模式，科学的果树管理方法，丰富的果树管理经验与您分享，欢迎留言或来电咨询。