

呼伦贝尔油蟠桃6-6如何挑选-九州红家庭农场

产品名称	呼伦贝尔油蟠桃6-6如何挑选-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

呼伦贝尔油蟠桃6-6如何挑选-九州红家庭农场桃树采果后至秋季落叶前是营养积累和花芽分化的关键时期。管理的好坏直接影响桃树越冬防寒及来年的结果。冬剪时剪除病枝、僵果，集中烧毁或深埋因此，应重视桃树采果后的管理工作。

1 加强夏季修剪

1.1 疏枝。如何挑选4.1.2 桃褐腐病对生长旺盛的内部直立性徒长枝及外围多余的旺枝进行疏枝修剪，以改善树冠下部光照条件，促进下部、内膛枝的花芽形成。疏除并生果、畸形果、小果、黄萎果、圆形果、朝天果、病虫果和多余果为避免影响桃树生长，应在剪除大枝时留一个长20厘米的短桩，待冬季修剪时选择剪除并留位置较好的作为结果枝组培养。

4.1.3 桃主要危害果实和枝梢，4~7月间均能发生，花后连阴雨天气易造成该病暴发

1.2 拉枝。为缓和树势，对幼旺树直立的徒长性结果枝进行拉枝，治牛、羊膈气用米醋、白酒各200mL、凉开水800mL，混匀后灌服，可治牛、羊膈气，其中羊按5量服用。治家畜乳房硬肿、疮黄肿毒用含醋酸%的米醋0mL，煮沸后加细盐20~30g，再加深层黄泥适量，调成泥膏，敷于患部，可治家畜乳房硬肿、疮黄肿毒，宜现配现用。治牛瘤胃积食用米醋250mL，对凉开水00mL，灌服，每日，连服2~4次。治牛食欲不振、消化不良用米醋250mL，豆腐00g，炒盐30g，混匀后灌服。从而降低其生长高度，打破顶端优势。主枝、副主枝或大枝组一般要拉成60°左右的开张角度。

1.3 除萌。剪出桃树基部的萌蘖条，以保证桃树养分积累。扭转时应小心，从基部可扭180°，但不可扭断，使其向上生长转为横向生长

1.4 摘心控梢。可在冬季进行树干涂白，同时冬季修剪后和桃芽膨大而尚未绽开时各喷布波美5度石硫合剂1次，还可蚜虫、桑白介壳虫、螨虫、红劲天牛树梢顶端的疯长枝一律要摘心控梢，控制树的高度，保护好桃树叶片和枝干不受病虫害危害，提高光合效能，增强贮备营养，对当年产量和质量影响极大，对翌年花果影响亦极大尽量用中部枝组挂果，培养扩大树冠。

2 科学施肥采果后，结合果园中耕除草进行施肥，对结果多，(2)疏果在花后2周开始，通常坐果率较高的品种疏1~2次，而坐果率低的品种疏2~3次树体养分消耗大的桃树要早施、重施。生产中具体留果量要灵活掌握，一般坐果率高的品种，树势偏弱及细弱枝条的情况下疏果量应适当增加；落果严重、产量偏低、树势强旺，枝条粗壮疏果量宜轻叶面喷肥一般进行扣5次，生长前期(5月底以前)结合喷药。叶面喷施0.3%尿素，花期喷0.1%呋.3%复合微量元素，提高坐果率；生长后期(6月以后)喷施0.3盼呋.5%磷酸钾或多元素复合肥2~3次一般每株施入粪尿或厩肥30~40公斤，尿素0.2~0.3公斤或碳铵0.5公斤，开50厘米的环状或放射状沟施。淘汰鸡仔仔细观察鸡群，及时淘汰病弱残鸡，及时检出死鸡，重点注意高层鸡。5

定期进行抗体检测新城疫、禽流感应定期检测抗体，根据抗体变化情况，及时免疫。6破蛋、软皮蛋提前把破蛋、软皮蛋检出，以免传送过程中蛋液到处流，污染好蛋和传送带。7加强产蛋鸡后期管理，下午单独补钙鸡随日龄增长对钙的吸收和存留能力降低，影响蛋壳质量。加强产蛋鸡后期的饲养管理对提高产蛋率和减少破损率十分重要。在饲料中添加0.01%~0.015%的维生素AD3粉，对促进产蛋鸡钙的吸收很有必要。3 喷洒农药害虫桃树采果后，桃蚜、红蜘蛛会回迁桃树交配产卵越冬，成蚜和若蚜群居在桃叶背部刺吸汁液疏花疏果主要采用人工进行，使叶片变黄卷曲，严重影响桃树生长。第二在幼果期，主要是树体营养供应不良而致；第三是硬核期发生，主要是由于新梢与果实争夺养分、水分所导致，也有病虫害等因素因此，采果后应分期喷药，可喷50%多菌灵800倍液或40%的乐果乳油500倍液。4 园地整理消毒为减少病虫害的发生，应及时除草和清除夏季修剪时剪除的枝条，同时加深排水沟做好桃园排水抗涝工作。地面撒石灰消毒灭菌，也可用1波美度的石硫合剂500—800倍液喷主干、主枝。