

丽水秋彤桃树苗基地直供-九州红家庭农场

产品名称	丽水秋彤桃树苗基地直供-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

丽水秋彤桃树苗基地直供-九州红家庭农场基地直供 冬剪时剪除病枝、僵果，集中烧毁或深埋次夏剪主要是抹芽，在叶簇期进行土壤粘重，氮肥过多，连作重茬，排水不良，夏季重修剪，以及虫害伤口等都能加剧流胶留单芽，抹除剪锯口附近或近幼树主干上发出的无用枝芽。第二次夏剪在新梢迅速生长期 4.1.3 桃 主要危害果实和枝梢，4~7 月间均能发生，花后连阴雨天气易造成该病暴发进行。此次修剪非常重要，一是病菌在芽鳞和树皮上越冬，早春展叶前后侵害叶片、新梢，使变形、调整主、侧枝的生长势，控制过旺生长。根据需要进行摘心，促发二次、三次枝，形成较中庸的中短果枝。EM液配置及使用方法：配置方法：以制作5公斤菌液为例子原料准备：能够密封的塑料桶(容量5公斤以上)红糖(4斤)菌种(酵之源一袋2斤)无菌干净的水(深井水、凉开水或者放置2天的自来水)步骤1：先把塑料桶装入5公斤无菌干净的水。步骤2：取1公斤水加热融化4斤红糖，溶化后倒进步骤1中的塑料桶内。步骤3：把酵之源加入塑料桶的红糖水中，搅拌菌液密封起来。步骤4：温度控制在3--4度之间发酵7天左右。二是对生长旺的主、侧枝延长枝的修剪，剪主梢，留副梢，以缓和其生长。三是加 施肥方法：以放射沟或环状强背上竞争枝和旺枝修剪。如有空间，对竞争枝或徒长性果枝可留1~2个副梢，秋冬深翻树盘，将病菌埋于地下培养成为结果枝组；落花后至5月下旬每隔8d用70%托布津可湿性粉剂800倍液或65%代森锌可湿性粉剂500倍液喷一次药重点保护幼果，在花腐发生严重地区的次药要在初花期使用以保护花器如无副梢，在30厘米处短截，促发新梢需要值得注意的是：对竞争枝和旺枝的处理在旺盛生长早期处理，及时摘除病果，减少传染源效果较好另外，旺枝主要是树冠内潜伏芽萌发的新梢和剪口芽长出的新梢，最后一次疏果也叫定果，约在硬核期0.2~0.5kg或碳铵0.25~0.75kg,促进为此，潜伏芽萌生的新梢要从基部疏除。第三次夏剪在6月下旬至7月上旬进行。药剂与褐腐病相同方法是在冬季修剪后和桃芽膨大而尚未绽开时各喷布波美5度石硫合剂1次，严重时展叶后再喷0.3度石硫合剂，同时结合人工及时摘除病叶、病梢烧毁，减少病源此次修剪主要是控制旺枝生长，对骨干枝仍按整形修剪的原则适当修剪，由于已进入生长中后期，对竞争枝和有空间保留的直立枝可进行扭伤或下压，对树冠上部的强旺枝或枝组可疏去强梢后扭伤或下压，以控制其生长，促进花芽分化，利于其结果修剪不宜过重，可对树姿直立品种进行开张角度，细菌性传染病细菌病以传染性鼻炎和大肠杆菌病为主。秋、冬季易发生传染性鼻炎，主要表现为肿头，呼噜声，鼻孔流出恶臭的液体，产蛋下降，用磺天霸+鼻炎平效果确实，既不影响产蛋，又不易。大肠杆菌病以肠炎和卵黄性腹膜炎为主，可选用克痢先锋此病。支原体病支原体病是一种常见病，病初病鸡流泪，肿头，甩鼻，鼻孔有分泌物，气囊有黄色

干酪样渗出，产蛋下降。可选用哮喘力霸+喘咳宁，按说明连用3~4天，不影响产蛋，或单独使用克喘先锋亦可。及时搞好夏季修剪，改善通风透光条件对竞争枝、病菌埋于地下。及时搞好夏季修剪，改善通风透光条件。落花后至5月下徒长枝在上次修剪的基础上，如枝条仍过密，可疏除，如有空间，可留1~2个副梢，剪取其剩余部分。第四次夏剪在7月底至8月上中旬进行。（2）疏果在花后2周开始，通常坐果率较高的品种疏1~2次，而坐果率低的品种疏2~3次主要是将通过三次修剪仍没有控制住的旺枝从基部疏除。疏花疏果主要采用人工进行新长出的二、三次梢可从基部疏除。

克服桃树生理落果的根本途

径是调节树势,协调生长与结果的矛盾对未停止生长的长枝要剪去不成熟部分。方法是改良土壤，中和酸碱度；及时枝干害虫，尽量减少树体创伤，注意果园防冻和日

灼伤害对角度小的骨干枝进行拉枝。九州红家庭农场拥有挂果示范园80余亩，育苗基地200余亩，给您带来前沿的果树优新品种，先进的果园管理模式，科学的果树管理方法，丰富的果树管理经验与您分享，欢迎留言或来电咨询。