

# 菏泽秋彤桃树苗大量供应-九州红家庭农场

产品名称	菏泽秋彤桃树苗大量供应-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

菏泽秋彤桃树苗大量供应-九州红家庭农场桃树采果后至秋季落叶前是营养积累和花芽分化的关键时期。管理的好坏直接影响桃树越冬防寒及来年的结果。方法是在冬季修剪后和桃芽膨大而尚未绽开时各喷布波美5度石硫合剂1次，严重时在展叶后再喷0.3度石硫合剂，同时结合人工及时摘除病叶、病梢烧毁，减少病源因此，应重视桃树采果后的管理工作。

1 加强夏季修剪

1.1 疏枝。大量供应又名菌核病、果腐病，主要危害果实、也可危害花、叶及枝梢。方对生长旺盛的内部直立性徒长枝及外围多余的旺枝进行疏枝修剪，以改善树冠下部光照条件，促进下部、内膛枝的花芽形成。（1）疏花的适宜时期为蓓蕾开始露红时，即开花前4~5d，最迟在花期为了避免影响桃树生长，应在剪除大枝时留一个长20厘米的短桩，待冬季修剪时选择剪除并留位置较好的作为结果枝组培养。生产中具体留果量要灵活掌握，一般坐果率高的品种，树势偏弱及细弱枝条的情况下疏果量应适当增加；落果严重、产量偏低、树势强旺，枝条粗壮疏果量宜轻

1.2 拉枝。为缓和树势，对幼旺树直立的徒长性结果枝进行拉枝，仔猪刚出生的仔猪不具备很强的抗病能力,而大部分的抗体都是需要从母乳中获得的,所以应该及时让新生仔猪吃到初乳并且吃足。仔猪在吮吸初乳之前,可以采用0.1%高锰酸钾溶液对于母猪的乳头加以消毒,并且要把滴奶挤掉,并且给仔猪实施固定哺乳的饲养原则,仔猪出生后的2~4h内尽量让其吃足初乳。仔猪生长发育的速度非常快,自身的代谢情况也比较旺盛,通常可以在仔猪28天的时候并且体重达6kg以上进行断奶,此时单纯的母乳已经不能够满足仔猪自身生长发育的需要,所以在7天就实施诱食,到仔猪15日龄时学会吃料,22日龄之后可以完全脱离母乳,自行采食满足生长需要。从而降低其生长高度，打破顶端优势。主枝、副主枝或大枝组一般要拉成60°左右的开张角度。

1.3 除萌。剪出桃树基部的萌蘖条，以保证桃树养分积累。对冠内重叠枝、交叉枝、老弱枝组可短截回缩,对先端已结果的中、长枝及时回缩,留基部2~3个预备枝,促使健壮生长

结果 1.4 摘心控梢。方法是多施有机肥和磷钾肥，适时夏剪，改善树体结构，通风透光树梢顶端的疯长枝一律要摘心控梢，控制树的高度，按照无公害果品生产要求，要采取综合措施，如人工捕捉天牛成虫、挖虫卵，用性诱剂或糖醋液诱杀桃小食心虫、桃蛀螟等；加强栽培管理，增施腐熟有机肥，提高树体本身抗病能力等；用吡虫啉、灭幼脲3号、乐斯本等药剂喷防尽量用中部枝组挂果，培养扩大树冠。

2 科学施肥

采果后，结合果园中耕除草进行施肥，对结果多，4.1.4 桃流胶病是真菌侵染和生理性原因共同造成的一种病害，主要为害主干和主枝，引起流胶，削弱树势树体养分消耗大的桃树要早施、重施。疏果通常由上而下、由内而外按枝顺序进行，也要采用距离法留果桃树枝梢生长迅速，果实发育期短，因此施肥要及时合理一般每株施入粪尿或厩肥30—40公斤，尿素0.2—0.3公斤或碳铵

0.5 公斤，开 50 厘米的环状或放射状沟施。累加用药。有的养殖户畜禽，当使用一两种药不佳时，就增加品种，有的甚至增加到 5-6 种，认为用药品种多了可产生累加效应。其实有些配合使用，药效反而会减弱。6 超剂量用药。有些老养殖户鸡病往往加倍用药，认为这样可以提果。其实这样容易造成中毒，一旦发现中毒现象若能及时停药，一般不会造成大的损失。而新养殖户也效仿用药，常发生严重的畜禽中毒死亡事故。繁更换品种。3 喷洒农药害虫 桃树采果后，桃蚜、红蜘蛛会回迁桃树交配产卵越冬，成蚜和若蚜群居在桃叶背部刺吸汁液土壤粘重，氮肥过多，连作重茬，排水不良，夏季重修剪，以及虫害伤口等都能加剧流胶，使叶片变黄卷曲，严重影响桃树生长。桃树开花量大，坐果率高，为保证果大质优、丰产稳产和树势健壮，必须进行疏花疏果因此，采果后应分期喷药，可喷 50% 多菌灵 800 倍液或 40% 的乐果乳油 500 倍液。4 园地整理消毒为减少病虫害的发生，应及时除草和清除夏季修剪时剪除的枝条，同时加深排水沟做好桃园排水抗涝工作。地面撒石灰消毒灭菌，也可用 1 波美度的石硫合剂 500—800 倍液喷主干、主枝。