

大叶红颜丹东久久草莓苗种植注意事项

产品名称	大叶红颜丹东久久草莓苗种植注意事项
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

8月上、中旬拔除弱苗小苗和近母株的老化苗，挖掉母株苗(或摘除母株苗叶片)。黄芩是一种唇形科的中药材植物，在我国有着非常广泛的分布范围。其主要入药部位是其植株的根茎部，黄芩有着降压消炎、利尿利胆等各种功效。主要的种植面积集中在我国的北方地区。8月中旬后停止施肥，控制水分，促进花芽分化。对长势旺的苗地，可进行断根处理。

如果植物体内吸收相当多的氮素，会使植株徒长，营养生长旺盛，生殖生长推迟，吴茱萸的分蘖繁殖是非常简单的，和其他的一些药材相比要容易很多。但是分蘖繁殖一般是在冬季的时候对吴茱萸进行分蘖处理，也就是说将吴茱萸的侧根挖出，然后每隔十厘米左右将它的根部表皮割伤，再进行施肥，后覆盖上一层稻草或枯草。等到来年春季，伤口处就会生长出很多的根蘖幼苗，这时，我们只需要将上面的覆盖物揭除即可。即使将来产量较高，但畸形果比例增加。因此，要达到既提早花芽分化，又能生长旺盛而且高产的目的，花芽分化前要降低植株体内的氮素水平，目前较为有效的方法是断根处理。判断植株体内的氮素水平，首先是观察植株叶片颜色。叶色浓绿，说明氮素水平较高。

秋栽根据作物的茬口一般在9月上旬-10月上旬，黄芩适宜生长在凉爽的环境下，在种植过程中其温度要控制在15度左右。要保证有一定的光照，其土壤排灌能力要强。虽然黄芩对土壤的适应能力较强，但是我们为了保证黄芩的产量及其品质。在选择土壤的时候要以土层深厚、肥力充足、无病虫害等为宜。春栽时期在3月中旬-4月中旬。