内蒙古京红青年鸡包产蛋率90以上内蒙古60天京红青年鸡包成活率七天

产品名称	内蒙古京红青年鸡包产蛋率90以上内蒙古60天京红青年鸡包成活率七天
公司名称	鹤壁市山城区常盛蛋鸡青年鸡养殖场
价格	14.00/只
规格参数	产蛋率:90%以上 成活率:到场7天以内 鸡苗:北京峪口
公司地址	山城区鹿楼乡汪流涧村1号院
联系电话	17530398763

产品详情

青年鸡的管理与雏鸡管理同等重要。管理技术要严而细，既让它生长又要适当控制生长，既要适当早熟又要控制早熟，因此，除遗产，营养外，管理是**关键的一环。内蒙古京红青年鸡包产蛋率90以上内蒙古60天京红青年鸡包成活率七天一、饲养1、在保证合理的营养供给的基础上必须结合合理的饲养管理。6一8周龄前，雏鸡采食量很少，应激较多，很大程度上影响雏鸡的生长发育，这个时期需要提供高营养的日食，特别是注重维生素的供给，尽可能使雏鸡在8周龄时达到标准体重，若出现8周龄体重没有达标时，万万不可将雏鸡饲料换成青年鸡料，应延长小鸡料的供给时间，利用8一12周龄体重快速增长潜力，以高营养日粮饲喂使体重在10一12周龄达到体重标准范围以到达体重上线为好。2、小鸡采用破碎料，可以添加适量的沙粒，具体添加方法是：3__8周，3一4毫米大小2克/只/周，8周以后【转入育成舍】4一6毫米大小3克/只/周。 内蒙古京红青年鸡包产蛋率90以上二、管理1、转笼、笼育的雏鸡进入育成期后，刚下笼的鸡不太习惯，容易挤堆造成伤亡，要注意看护，特别是在夜间，更要注意温度变化，防止挤堆造成损失。转笼时前后2天应在饮水中加入电解多维及抗菌素，防止应激反应。2、做好卫生**工作，育成期常发生的疾*有球虫*、黑头*、支原体*及一些体外寄生虫*等。定时清扫鸡舍，通风换气，疏散密度，严守消毒制度等。内蒙古60天京红青年鸡包成活率7天3、保持环境安静，育成期特别在开产前，鸡对环境变化的反应很敏感。在日常管理上应尽量减少干扰，保持环境安静，防止噪音。4、淘汰*鸡弱鸡。为了使鸡群整齐一致，育成期要集中进行两次挑选和淘汰。*次在8周龄后，选留发育快的，淘汰发育不全过于弱小和残*的鸡。第二次在20周龄后，挑选外貌结构良好，母鸡脸部开始发红，喙、腿发黄，羽毛发亮，鸡冠逐渐变大的健康鸡，淘汰那些体重过小及*残鸡。内蒙古青年鸡包产蛋率5、开产前转舍。在18周龄前，育成鸡必须转入产蛋鸡舍饲养，使鸡有2一 3周的时间适应新的生活环境，以利于产蛋，18周龄的青年鸡正进入一个加速生理变化达到性成熟的产蛋时期。在这个时期如果发生应激将会推迟鸡的生长发育，延缓开产，并影响蛋重。转舍入笼饲养，应预先准备好饲料和饮水，让鸡进笼后立即能饮到水，吃到料，*初两周应多提供一些维生素添加剂，给予精心的饲养管理，使鸡讯速适应新的环境，按时开产。 内蒙古青年鸡包成活率

高温管理要点：蛋鸡夏季饲料要三增一减

夏季天气炎热，蛋鸡容易发生食欲下降，采食量减少等问题，因此其产蛋量受到影响。为了保持蛋鸡夏季能高产，专家建议，应调整其日粮水平，作到“ 三增一减 ”。 适当增加蛋白质饲料 夏季气温高，由于受热应激影响，鸡采食量会明显下降。如果日粮中不增加营养物质，受采食减少的影响，就不能满足蛋鸡生长和产蛋的需要。由于蛋鸡夏季日粮中蛋白质的不足，会直接影响产蛋量，所以，夏季日粮中蛋白质的含量应比其他季节高1%~2%。即日粮中需要增加豆饼或棉籽饼饲料，用量可达20%~25%。另外，动物性蛋白饲料如鱼粉、肉血粉或鱼虾下脚料等的用量可占饲料的5%~7%。京红青年鸡包产蛋率90以上

适当增加矿物质饲料 夏季多数产蛋鸡正处在产蛋高峰的中后期，鸡群对钙的需要量增加，所以日粮中的钙磷比例要适当，一般配合饲料中的钙质含量应调整为3.8%。配合饲料中的钙的含量过多或过少，都会对蛋鸡料的适口性以及鸡群产蛋率造成影响。为了增加钙的进食量而又不至于影响饲料的适口性，可将贝壳粉与饲料分开，单设槽饲喂，让鸡自由采食，以满足需要。京红青年鸡包成活率七天

适当增加青绿饲料及抗热应激添加剂 夏季在蛋鸡饲料中适当增加一些青绿多汁饲料，增喂青绿多汁饲料还可增加饲料的适口性，节省部分日粮，降低养鸡成本。同时，在饲料中还可增加一些抗热应激的药物，如清凉一夏、小苏打等以减少高温对蛋鸡的影响。青绿饲料用量应适宜，一般不超过日粮的30%~40%。 适当减少能量饲料 因为夏季气温高，鸡维持自身体温所需要的能量比寒冷季节要少得多，所以夏季蛋鸡日粮中应适当减少玉米、高粱等含能量高的精料，其用量一般夏季不超过50%~55%。同时，可增加一些糠麸类含能量低的粗饲料，用量一般不超过15%~20%。内蒙古京红青年鸡