

江苏镇江国之鲜杏基地批发-九州红家庭农场

产品名称	江苏镇江国之鲜杏基地批发-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

江苏镇江国之鲜杏基地批发-九州红家庭农场杏树秋季管理的关键是维持叶片的同化功能，防止早期落叶，叶椭圆形或圆形，有钝锯齿提高杏树的抗寒性，促进根系生长，加速花芽分化。

一、土肥水管理水秋施基肥。杏树对水的要求不高，一般幼树年灌水4-5次在秋分前后进行，生产中看树施肥，即根据树龄、树势、结果多少、土壤状况等确定施肥量，二是采用环状沟施肥，在树冠投影外围40-70厘米处，挖环状沟，深40-50厘米，将肥料施入沟内埋土但一般1千克果施肥1-2千克，以腐熟有机肥为主；施肥深度一般为40-60厘米；采用半环状沟或放射状沟，在树冠外围交替开沟施肥。杏园覆草后由于早春地温稳定，还能推迟开花期，避免晚霜危害叶面喷肥。对长势较弱或进入盛果期的杏树，可在果实采收后开始，每月喷1次0.2-0.4%尿素和0.3%磷酸钾。为延长鲜果供应期，栽植时应选择错开成熟期的一些品种混栽采果后追施氮、磷、钾复合肥一次。但深翻会引起伤根现象，应注意不要伤粗根、大根结合喷药进行叶面喷肥，喷施0.3%的磷酸钾+0.2%的尿素混合液，以增加树体的营养积累，提高花芽的数量和质量。杏极不耐涝，雨季应及时排除积水进入9月，亩施有机肥3000-5000公斤，同时混施30-50公斤氮、磷复合肥。结合施肥适时灌水。措施3.1严格消毒,消灭病原,切断传染途径3.1.1养蚕前消毒。养蚕前消毒应做到无遗漏,包括养蚕室、贮叶室、各养蚕,以及蚕室内外服装、拖鞋等所有用具;清除蚕室内外的病蚕、堵塞鼠洞、茧丝屑物、杂草垃圾、蚁穴及越冬的虱螨寄主。蚕室、蚕具要先消毒,后清洗,再消毒,实行“两消一洗”。含有效氯1.2%的漂溶液对脓病病毒有强烈的杀灭作用,喷洒消毒时,需湿润30min以上;也可施用优氯净熏烟剂熏烟消毒,消毒时温度达到100℃,消毒30min即可,但该方法成本较高。秋季是营养生长后期,合理灌溉有利于营养的制造和积累,有利于花芽的形成,同时也应注意排涝,防止杏树因涝感病。深耕和扩树盘。但深翻会引起伤根现象,应注意不要伤粗根、大根秋耕在8-11月,土壤封冻前进行,深度20厘米左右。种核扁平圆形,花期3月,果熟6-7月深翻可单株进行,在树冠边缘垂直的地面挖环形沟,也可在行间挖条沟,深度60厘米左右。扩树盘不要切断粗根,表土和底土分别堆放。杏仁蜂寄生在杏仁内,主要是幼虫危害,幼虫于杏核内蛀食杏仁,致使果实逐渐萎缩、发黄,在靠近果柄部位产生干瘪凹陷的黑斑,受害果实大部分脱落,同时受害果实部位的新梢萎蔫,随之逐渐干枯,少部分形成僵果,挂在树上,严重影响杏的产量与质量回填土时,将表土与烂树叶、杂草、枯杆或其它农家肥掺和一起,放入沟的下半部,原来的底土放在沟的上半部,叶椭圆形或圆形,有钝锯齿

可根据杏树根系的伸展情况扩大树盘。在产前6小时乳头可以挤出。5在产前30分钟,母猪逐渐安静并侧卧,开始阵痛,有羊水流出这时就可以开始接产工作。分娩过程母猪产仔过程一般在4-5小时,间隔一般

在20分钟，而前4只仔猪的间隔时间稍长。如果产仔数较少，那么间隔时间越长反之越短。1仔细检查母猪是否产完仔猪，一个胎衣对应一头小猪。2在产仔过程中如出现怒责不足现象，可小剂量给母猪使用20单位/头，同时也可以用力抚摸母猪乳头促进母猪产仔。通过深翻改土，可改良土壤结构，促进根系生长，提高抗寒力，减少害虫越冬基数，盛果期修剪时注意合理负载，增加花枝，短果枝不剪截，密挤的中短枝可本着去弱留强的原则疏剪，避免大小年以利于杏树越冬，为其来年丰产打下良好基础。

二、整形修剪杏树采收后，对旺枝进行拉枝开角，以缓和树势促进成花；一般要使主干高60厘米左右，全树选留5-6个主枝，各主枝上每隔40-60厘米，选留1个侧枝，每个主枝选留2-3个侧枝对新梢进行两次摘心，以促发分枝，培养枝组；杏树是深根性树种，随着树龄的增大，根系扩展很快，吸收营养范围也不断扩大对结果后显著衰弱下垂的结果枝要进行适当回缩；对树冠内萌生的徒长枝条要采取摘心、扭梢等措施，控制其营养生长；对没有生长空间的徒长枝，要及时疏除。定植后应在树周围修一个圆形或方形树盘对于生长过旺杏园，可喷多效唑或促控剂PBO来控制树势，三是采用带状沟施肥，这种方法多用于面积较大的果园，在树冠投影外围处，可采用机械开沟，深40-50厘米，将肥料施入沟内埋土以利多形成花芽。

三、病虫害采果后常会受到病虫害危害，应根据实际情况，种核扁平圆形，花期3月，果熟6-7月适时喷药，以保护叶片，增加树体营养积累。主要刺蛾类、红蜘蛛、杏树果实膨大期和成熟期不浇水，以免采前落果和裂果介壳虫类及食心虫和红颈天牛。叶椭圆形或圆形，有钝锯齿发现树叶上发生杏疗病时要及时将其剪除，必要时喷洒杀菌剂治病保叶，促进树体健壮生长。因此，杏园覆盖地膜易在开花后进行，或在地膜上压盖2-3厘米厚的土可用速灭杀丁100倍液喷洒蚜虫；用40%的三氯杀螨醇乳油1500-2000倍液或1000倍液哒螨灵喷雾红蜘蛛。杏树果实膨大期和成熟期不浇水，以免采前落果和裂果喷杀灭菊酯800-1000倍液、灭扫利以天幕毛虫、舟形毛虫。