

## 香蕉草莓草莓苗种植注意事项

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 香蕉草莓草莓苗种植注意事项 |
| 公司名称 | 泰安市龙烁苗木有限公司   |
| 价格   | 5.00/棵        |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区     |
| 联系电话 | 15166482777   |

## 产品详情

大棚栽培应选择休眠较浅的种类。假定选择休眠性较强的种类，缙草喜湿润的环境，所以要经常浇水保持土壤湿润，尤其是在出苗期，如果土壤干旱可能会影响到出苗率，严重时导致种子不能顺利出苗，造成烂种。次施肥在春季出苗后返青后进行保温袒护不宜过早。二是育苗过程中，公道施肥，加强办理，培养壮苗。

大棚草莓生长期长、产量高，对肥料的需求量也大。在施足基肥的基础上，还必须进行追肥。追施磷钾肥还可以提高草莓的含糖量，增加甜度，改善品质。缙草是采用播种进行繁殖，在6-7月，大多数的种子呈黄褐色是，将其采收，晒干备用，收集种子时要注意，缙草的种子比较细小，极易水封飘落。一般采用秋播，在9-10月时在畦面上按行距40厘米开沟，将种子均匀播入，注意覆土不宜过深，1厘米为宜。播种后遇干旱要及时浇水，约7-10天即可出苗，如果是在高寒地区，可以在春季3月播种。一般在顶花芽现蕾后开始第1次追肥，以后每隔15~20天追肥1次。追肥时随着浇水每亩施入氮磷钾冲施肥5~10千克。在浆果接近成熟采摘时，要增加钾肥的追施比例，以提高浆果的含糖量。

匍匐茎发生的时候，光照越强、温度越高，匍匐茎发生量越大，这时正是生长旺季，每亩追施1500公斤的人畜粪水，同时每一周喷洒一次叶面肥。在现蕾后，除了留种田外，其余要摘除花蕾，减少养分消耗，集中养分供应根部，促进块茎膨大，提高产量。出茎的速度越快，所以一般在五六月份温度上来光照变强的时候