

湖南娄底珍珠油杏成活率高-九州红家庭农场

产品名称	湖南娄底珍珠油杏成活率高-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

湖南娄底珍珠油杏成活率高-九州红家庭农场杏树是我国常见的经济林树种，栽培历史悠久，种质资源丰富。成活率高杏树的果实味道酸甜，果肉多汁，营养丰富，果仁还具有价值。种核扁圆形，花期3月，果熟6~7月同时，杏树早春开花，先花后叶，极具观赏性，可与苍松、翠柏配植于池旁湖畔或植于山石崖边、庭院堂前，具有极高的观赏价值。覆草面积应以树冠大小为基准，草厚15~20厘米，上面压2~3厘米厚的土防风，逐年补充，4~5年刨翻一次现将杏树的栽植技术介绍如下1)栽植密度。杏树栽植密度确定的原则应综合考虑土壤、水肥状况、杏树品种、分枝习性、生长势、对光照的要求、管理技术水平等因素。因此，每年要深翻树盘，保持土壤的通透性，增强保肥蓄水抗寒力，减少害虫越冬基数如果土壤肥沃，肥水条件良好，宜适当稀植，一般采用4~5mX5~6m的株行距，因为在这种情况下，树体发育的往往比较繁茂，生长旺盛，杏园易郁闭。而在地力比较贫瘠、水利条件较差时，一般采用4~5mX2~3m的株行距，以利于充分利用空间。因此，杏园覆盖地膜易在开花后进行，或在地膜上压盖2~3厘米厚的土山地杏园可较平地密度高些；生长势强、树势开张的品种不宜过密，而直立型或紧凑型品种则可加大密度。杏树果实膨大期和成熟期不浇水，以免采前落果和裂果管理技术水平高的可密度大点，否则应适当减少株数。2)栽植方式。在保证限度的利用土地，充分利用空间光能、便于管理的前提下，确定栽植方式。落叶乔木，株高5~12m，树冠圆形或椭圆形，小枝褐色或红褐色生产上常采用的方式有：一是长方形栽植。行距大于株距，通风透光好，便于管理和机械化操作，是生产上普遍采用的一种方式。二是正方形栽植。土壤施肥可在秋季结合深翻进行，宜早不宜迟行距和株距一样，光照好，便于管理，杏仁油除食用外还可用做精密仪器和军事工业所需的高级润滑油、除锈剂以及生产化妆用品、优质香皂、高级油漆的原料但不适于密植。3)栽植时期。杏树栽植宜在休眠期进行，可分春栽和秋栽两种。二是采用环状沟施肥，在树冠投影外围40~70厘米处，挖环状沟，深40~50厘米，将肥料施入沟内埋土春栽是在土壤解冻以后，杏苗萌芽以前进行。华北地区一般在3~4月。秋栽则在落叶以后，土壤封冻以前进行，华北地区一般在10~11月。无霜期短、冬季寒冷的地区，春栽比较适宜，多采取夏秋挖坑，冬季积蓄雨雪，春季栽树，这种方法不仅栽植成活率高，而且也省去新植幼树培土防寒的麻烦。杏极不耐涝，雨季应及时排除积水秋季降雨较多、春季干旱的地区，采用秋植容易成活，因为此时土壤湿度和空气湿度都较大，且距翌春发芽的时间长，有利于根的恢复，缓苗期短。22~26天每一天晾2次，晾蛋的时间长短不等，根据情况灵活掌握。喷水喷

水是高出雏率的关键措施之一，喷水能使蛋壳松脆，孔雀的蛋壳上膜厚，蛋壳坚硬，为此在孵化22~26天每天喷水一次，水温35℃左右，待干后继续孵化在反复晾蛋喷水的作用下，蛋壳由坚硬变松脆有利雏鸟破壳而出。照蛋次照蛋为6~8天主要检查种蛋情况。正常蛋能看到黑色眼点，蛋内颜色发红并带有血丝，无精蛋任何变化也没有，蛋黄完整、蛋清透明，要及时取出无精蛋。但秋植的杏树在严冬到来之前宜采取埋土防寒措施，否则宜发生抽条和冻害，降低成活率。种核扁平圆形，花期3月，果熟6~7月另外，决定春植或秋植，除考虑气候条件外，还要根据劳力情况而定，在春季农活繁忙劳力紧张的情况下，可在秋末栽植。4)栽植方法。根据确定的栽植方式和株行距，先测定栽植点，可用撒石灰或插木棍的方法作标志。落叶乔木，株高5~12m，树冠圆形或椭圆形，小枝褐色或红褐色然后在定植点上挖定植穴。定植穴的大小可根据土壤结构而定，山区薄地或黏质土壤地应挖大坑，肥沃的沙质土壤可挖小坑；挖出的表土和底土分别放在坑的两侧。株行距4~5m×5~6m，贫瘠地可适当加大栽植密度，秋植或春植将底翻松，每坑施适量的有机肥与表土混合，填入坑底填好踏实，灌足底水，这样栽植后穴土不致下陷，防止苗木因穴土下陷而栽植过深，影响生长。一是采用放射状沟施肥，以树干为中心，树盘1/2处为起点，向外挖6~8条放射状沟，深30~50厘米，里深外浅，沟长超过树冠外围，然后在沟内施肥栽植深度以苗木原来的根颈部稍低于土面为宜(一般不超过接口)，若栽植过深，土温低、通气差、缓苗慢，成活后发育不良；若栽植过浅，容易失水，被风吹倒，影响成活。杏树为阳性树种，深根性，喜光、耐旱、抗寒、抗风、耐贫瘠，不论平原、山区、丘陵、河滩、沙荒盐碱地均能生长结果，管理比较容易，投资少经济效益高栽植后，立即浇透水。盛果期修剪时注意合理负载，增加花枝，短果枝不剪截，密挤的中短枝可本着去弱留强的原则疏剪，避免大小年为了提高栽植成活率，在有条件的地方，可采用地膜覆盖法。土壤施肥可在秋季结合深翻进行，宜早不宜迟具体方法为：浇水后，立即埋土，用塑料薄膜将栽好苗木的坑面覆盖好，四周压紧封严，使坑内水分不易蒸发；覆盖薄膜后，土温升高，有利于生根。怀孕后期的饲养。身体的怀孕的母羊体内羊胎发育迅速，饲养在这个时期应注意蛋白质含量、辅以大骨粉补量，条件还可以用家用兽用鱼肝油，促进胎儿发育，提高钙、磷等元素的吸收，主食以混合青料为主(1kg)高质量干草搭配。2)喂养母羊。哺乳期母羊由于羔羊依靠母乳生活，导致哺乳母羊体质下降，为了保护母羊产奶，需要补充大量营养，以绿色、多汁饲料为主。配合丰富蛋白质饲料，辅以鱼粉、饼类等动物性饲料进行饲养。饲养种公羊：种公羊数量少，价值相对比较高，对后代影响也非常大，所以在饲养上要精饲料，以保证健壮，使在繁殖期内，精液质量高，性欲强。同时，保水保墒作用明显，在苗木发芽前，可不再浇水。九州红家庭农场拥有专业的挂果示范园，根据果品实际表现采穗嫁接保证品种纯度，大型的育苗圃200余亩，货源充足，有全国各地的农户种植经验反馈，多年的果树管理经验给果农朋友提供借鉴。与我一份信任，成就永远的朋友。