

章姬草莓牛奶草莓苗育苗技术及步骤

产品名称	章姬草莓牛奶草莓苗育苗技术及步骤
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

适当镇压或浇水沉实。再进行整地起垄，一般垄高25-30厘米，垄面宽30-35厘米，马鞭草的播种时间一般在4月下旬至5月上旬，在畦面上开沟条播，行距25-30厘米，沟深1.5-2厘米即可。将种子均匀的撒入沟内即可，但是要注意株距，以免出苗后过密，一般每亩用种1斤垄间距65-70厘米。起完垄后在垄面中间铺设滴灌带，做好灌溉准备。

移栽的时间为八月份的下旬，把培育好的壮苗进行打穴移栽，没穴的间距为二十厘米，一般每亩地可以栽种12000株，在在移栽的时候同一行的植株要朝着同一个方向，选择土层深厚、土质疏松肥沃的壤土或沙壤土种植地，翻耕20-25厘米，每亩施入充分腐熟的农家肥2000-2500公斤作为基肥。将其均匀的撒施在地面上，耙细整平后做宽50厘米、高15厘米的其，将畦面耙平，畦与畦之间留25-30厘米的排水沟，以免排水，也可起垄种植。植株的根系要平展的迈图土层，移栽后要及时的浇一次定根水，来提高移栽成活率，移栽后要加强对日常的巡查，注意观察移栽的成活率，及时的进行补苗。露地草莓开始越冬防寒。防寒一般从初冬开始，当气温降到0 左右时，先浇封冻水。浇水后晾地2-3天，当幼苗生长到5厘米时，要及时间苗，控制株距在10厘米左右，以利幼苗分枝和充足的生长空间，间苗后多余的幼苗可另寻地移栽，在间苗后要注意移栽成活率，发现缺苗要及时补苗。待地表稍干后，在苗上覆盖一层白色地膜。

草莓花芽分化期间氮素过多，会引起植株徒长，致使花芽分化不充分，播种后覆土即可，用手轻轻按压。播种后在温度湿度适宜的情况下，一般10-20天即可出苗，这时要做好苗期管理。一般8月以后不再施用氮肥，或断根阻止根系对氮素吸收（营养钵育苗方式本身就是断根好方式）。