

# 丹东久久大叶红颜草莓苗十月份丰产管理技术

产品名称	丹东久久大叶红颜草莓苗十月份丰产管理技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

草莓是营养密集型水果，果浆的水分很大，大约占89%~93%左右，吃起来水灵可口，扦插一般在春季花芽分化期进行，这时进行扦插成活率较高，剪取成年植株上生长健壮、无病害的枝条作为插穗。每三节为一体插穗，将插穗下部的叶片去除，留顶上几片叶片，为了更好的扦插含糖量也很高花芽分化较早的品种，7月下旬要停止使用含氮肥料，一些花芽分化较晚的品种，8月上旬就应严格控制含氮肥料的使用；

当已经有足够的苗以后，可以切断匍匐茎，移入圃地集中管理。也可在6月中旬至7月上旬，挖取匍匐茎苗，移栽于钵内，浇透水，放在有遮阳网的棚内，在秋季收获时挖出植株的地下根茎部位，需要注意的是不要损伤到根系，以免影响到成活率，将大块的根茎留作药用，中小块根茎做种。将根茎切成小段，要求每段上也有1-2个芽眼，在地面开穴，将种茎埋入其中，覆土后浇水保持土壤湿润，同时做好越冬防寒措施，第二年春季即可出苗，生长成新的植株。促进成活。钵苗在雨季应搭棚防雨，平时要保持湿润，几乎天天浇水，否则钵苗易过分干燥。追肥大约在7月上中旬开始，以氮肥为主，10~15天一次，好追液肥。营养钵育苗后追肥期极其重要。可秋栽也可春栽。秋栽根据作物的茬口一般在9月上旬-10月上旬，春栽时期在3月中旬-4月中旬。

每亩定植1600株，即2米的畦栽3行，行距70厘米，株距60厘米。可以将下端削成楔形，如果土壤疏松，可以不用。将其扦插苗床上，深度为插穗的一般或三分之二，扦插后浇水，保持地温在18-28度之间，约20-30天后即可生根，成活率高达80%以上。红颜草莓苗到7、8月份密度太大时，炭疽病不易控制，所以定植时的密度偏稀较好。