



试验将分离培养的细菌用生理盐水稀释后，经肌内注射日龄健康雏鸭，接种后24~48小时健康雏鸭发病死亡，并且具有鸭传染性浆膜炎的特征性临床症状和病理变化，从死亡雏鸭中能检测分离到该菌，即可确诊为鸭传染性浆膜炎。给果树充足的水分供其吸收，避免影响果实的发育。定植当年在距地面40~60厘米剪截定干。秋季进行驱虫秋季是牛羊进行驱虫的时期。常感染的寄生虫有肝片吸虫、圆形线虫(蛔虫、结节虫、钩虫、鞭虫等)，可通过检查其粪便和各种症状进行确诊后，根据感染寄生虫的种类选择驱虫药，切不可盲目用药。

3. 3 精配饲料促进育肥育肥是为了给养殖户带来较好的经济效益的一种价值体现，所以在配制育肥饲料时，要注意以下几点。能量饲料占比：玉米、高粱等60%~70%。蛋白质饲料占比：豆饼、大豆、棉籽饼等22%~25%。剪口下芽要迎着风向(西南)，剪口要呈斜面。米，还未木质化时为宜，将背上枝、竞争枝及内向枝，在距基部5~10厘米处，轻轻扭转180°斜面上方略高于芽尖，斜面下方与芽基部相平或略高。第二年春季在定干当年新发出的枝选3~4个向四周分布的枝条作主枝(如不够可下年选)。方法：一是秋季或春季翻树盘，破坏幼虫越冬场所，减少越冬虫量；二是在李小食心虫幼虫孵化盛期用5%来福灵乳油2000~4000倍液或40%磷乳油1000倍液喷雾，喷雾时注意喷至叶背叶面全湿各主枝间的角度与距离与图如示，如果枝条角度不合理，可采用拉枝或吊枝的方法纠正。疏除过密枝，不密的枝条留作辅养枝。按一个花束状果枝留1~2个果，短果枝留1个果(叶片少的短果枝可以不留果)，中果枝留2~3个果，长果枝留4~5个果；3. 肥水管理

3.1 花前追肥 根据各主枝的生长情况适当短截，剪去全长的1/4~1/3。第三年春季修剪，接近停止生长时进行，对旺树主干或大枝做环状剥皮，剥皮宽度为被剥梢条直径的1/10左右，促花效果明显在每个主枝中分别选1个角度开张，生长强壮的枝条作为主枝的处长枝，进行短截，剪去全枝的1/2左右，并在每个主枝下部选1~2个向外生长的枝条作为侧枝，短截1/3左右。通过连续摘心增加枝量7月中旬，在摘心枝的基础上，选出3~4个永久性枝，拉成60°~70°角，其余枝拉成80°，作为辅养枝主枝上着生5厘米以下的小枝尽量多留，培养成短果枝或花束状果枝，中、长果枝适当短截。正确的接种技术

3. 好接种的准备工作 免疫接种前应先检查鸡群的健康情况，健康鸡群才能按照标准的接种程序接种。接种前(后)48h补充抗应激制剂(雏鸡可使用维多利、大鸡使用维力康)以缓解应激和促进抗体的产生，青年鸡或成鸡接种前一周进行驱虫，免疫效果会更好。

2. 选择应激小的接种方式 接种鸡新城疫、法氏囊冻干苗可选择饮水免疫方式：鸡痘苗多在翅下无血管处刺种；接种喉苗则宜选择点眼方式，鸡场要根据疫苗特点和自己的技术水平选用适宜的免疫方法以减少应激。这样，经3~4年树形已基本确定，以后每年主、侧枝的延长枝修剪方法与上一年相同。

九州红家庭农场拥有挂果示范园80余亩，育苗基地200余亩，给您带来前沿的果树优新品种，先进的果园管理模式，科学的果树管理方法，丰富的果树管理经验与您分享，欢迎留言或来电咨询。