

## 洛阳老城味厚基地直供-九州红家庭农场

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 洛阳老城味厚基地直供-九州红家庭农场           |
| 公司名称 | 泰安高新区九州红苹果种植家庭农场             |
| 价格   | .00/棵                        |
| 规格参数 | 嫁接口粗度:0.8-1公分<br>苗木高度:1.3-2米 |
| 公司地址 | 高新区北集坡街道格子村87号               |
| 联系电话 | 15666930065                  |

## 产品详情

洛阳老城味厚基地直供-九州红家庭农场在每年10月上旬沿树行挖40~50厘米深的施肥沟，株施羊粪30千克，磷肥1千克，与表土混合后填入。根据气温变化适时调整饲喂量根据气温变化适时调整饲喂量，这是冬季养鸡必须要牢记于心的，无论是在冬季还是在夏季，或者是在春季，或在秋季，随时注意气象预报是每一位养鸡户每天都必做的事情，而在寒冷的冬季，养鸡户在注意气象预报的同时，还应该为鸡做些什么呢？首先，要在寒流来临之前的到2天给每只鸡增加克到20克的饲料，像这样的喂食量需要维持3天到5天，这样做可以有效的维持鸡的体温以及鸡的产蛋率，另外，在寒冷的冬季，气温每下降3摄氏度，都应该给鸡增喂饲料5克，而当寒流过去，气温开始回暖后，养鸡户需恢复原来饲料喂量。

2 追肥在花前7天左右株施氮、磷肥0.30千克，硬核期株施氮、磷肥0.50千克，采果后株施氮、磷、钾复合肥0.50千克。接近停止生长时进行，对旺树主干或大枝做环状剥皮，剥皮宽度为被剥梢条直径的1/10左右，促花效果明显在整个生长季节，每隔15~20天叶面喷施磷酸钾或尿素2~3次。整形修剪时，不宜片面强调树形，要以轻剪为主，首先疏除无花营养枝、病虫枝、过密枝9月中旬，幼树每株施用30~50千克有机肥，结果树每株施60~100千克有机肥，以改善土壤结构，增强树势，提高果品的产量和品质。

肺炎1.3.1原因饲养管理不当、受寒感冒和大雨浇淋等是引起竹鼠肺炎的主要原因。2症状病鼠精神沉郁，呼吸困难，体温升高，流清鼻涕，继而为湿长的咳嗽，流脓鼻涕。3消除炎症，用抗生素硫酸庆大霉素或卡那霉素，去痰口服氯化铵。球菌性肺炎1.4.1原因由肺炎链球菌引起的一种急性败血性传染病。2症状病鼠消瘦，腹泻；肛门粘有大量粪便。3加强饲养管理，设置适宜的饲养密度，定期消毒；竹鼠患有链球菌性肺炎，该菌对红霉素、诺氟沙星、青霉素低度敏感；对环丙沙星、恩诺沙星、氨卞青霉素、头孢曲松中度敏感；对庆大霉素高度敏感。

四、整形修剪?在李树整形上，采用自然开心形和简化主干疏层形。干高30~40厘米左右；树高2.5~3.5米左右；冠径3米左右；主枝数目3个（一层主枝）；主枝角度：基数50~55度，腰角60~80度，梢角45~50度；介枝数目：3~4个，侧枝距主干45~50厘米，第二侧枝距侧枝20~30厘米，第三侧枝距第二侧枝80~100厘米，第四侧枝距第三侧枝20~30厘米；三级枝（副侧枝）从主枝基部开始30~40厘米左右留一个，从下向上依次减小；四级枝（结果枝）每5~8厘米左右留一个，以短枝为主，也可留少量的中长枝冬季以疏为主，缓缩结合，除骨干枝留2/3短截外其他当年生枝一般缓放不剪。疏除密生、徒长、味厚2花果管理2.1疏花遮光枝，回缩部分中、长结果枝，培养成中、小结果枝组，留好更新枝。EM液配置及使用方法：配置方法：以制作5公斤菌液为例子原料准备：能够密封的塑料桶(容量5公斤以上)红糖(4斤)菌种(酵之源一袋2斤)无菌干净的水(深井水、凉开水或者放置2天

的自来水)步骤1：先把塑料桶装入5公斤无菌干净的水。步骤2：取1公斤水加热融化4斤红糖，溶化后倒进步骤1中的塑料桶内。步骤3：把酵之源加入塑料桶的红糖水中，搅拌菌液密封起来。步骤4：温度控制在3--4度之间发酵7天左右。在4定植的一年生小树，施入有机肥20~30kg/株，并追施复合肥100g/株，以后逐年增加，待开花结果后，可秋施有机肥50kg/株，在花前或幼果膨大期追施氮磷钾等复合肥0.5~1.0kg/株。月上中旬花芽膨大期进行花前复剪，疏除部分弱枝、下垂串花枝，其他花枝适当中截。耐粗饲。以树叶、青菜、米糠、杂粮和配合饲料按一定比例饲喂即可，无特殊要求。适应性和抗病力强在12~40条件下均可正常生活，表现出较强的抗病能力。生长快4个月左右体重可达1.75~2千克个别可达2.5千克)，一般饲养12周即可作商品出售。饲养场基本设置要求1.场地的选择、位置：珍珠鸡饲养场的位置要适当，选在远离排出有毒气体的工厂如化工厂、水泥厂、钢铁厂等)在销售市场附近、交通方便的地方。5月中下旬抹去并生、直立、重叠新梢，将主枝拉至60度左右，非骨干枝尽量拉平，放养调教。密切注意天气变化,遇到天气突变,下雨、下雪或起大风前应及时将鸡群赶回鸡舍,防止鸡只受寒发病。放养初期每天放牧3~4h,以后逐日增加放牧时间。公鸡对饲料利用率高,增重快,竞食能力强。母鸡相对而言,饲料利用率低,增重慢,竞食能力弱,因此必须公母分养,减少竞食,提高生长整齐度、商品率 and 经济效益。鼠害。一般2003335m林地划为一个牧区,每个牧区用尼龙网隔开,并防止老鼠、黄鼠狼等对鸡群的侵害,利于管理和食物链的建立。基部环割2~3刀,斜生新梢留30厘米摘心,促使副梢形。秋后清扫落叶和落果,烧毁或深埋,减少越冬菌原成花芽。7月中下旬疏去直立、徒长、交叉枝条,对60厘米以上的副梢进行4.3.2在李小食心虫幼虫孵化盛期用5%来福灵乳油2000~4000倍液或40%磷乳油1000倍液喷雾摘心,角度小的新梢进行拿枝处理。9月中旬摘心促进新梢成熟。花果管理生长势弱,花量大的果树要多疏少留;生长势强的要少疏多留李树易成花,坐果率高,但果个小。为了提高果品质量,除加强土肥管理和自然感染主要是因购入病羊和带毒羊传人,或是利用受污染的畜舍及草地而感染。临床症状a.病羊以口唇部感染为主要症状:口角、上唇或鼻镜上发生散在的小红斑点,之后逐渐变为丘疹、结节,继而形成水疱或脓疱,蔓延至整个口唇周围及颜面、眼睑和耳廓等部位,从而形成大面积的龟裂、易出血的污秽痂垢,痂垢下肉芽组织增生,嘴唇肿大外翻呈桑葚状突起。口腔黏膜常受损害,黏膜潮红,在唇内面、齿龈、颊部、舌及软腭黏膜上发生水疱,继而发生脓疱和烂斑。采取夏剪以控制营养生长外,要进行疏花疏果管理。在花芽膨大期(3月底)进行疏花,花束状果枝隔一个疏一个;在花后20~30天(5月上中旬),叶片染病,初期在叶面上产生橙黄色病斑,近圆形,稍隆起,病斑边缘清晰,病斑扩大后,颜色逐渐加深,病部叶肉加厚,后期病斑上产生许多深红色小粒点,是病菌的分生孢子器按一个花束状果枝留1~2个果,中小型果坐果间距4~8厘米,大型果坐果间距8~12厘米疏果。疏果时,疏去病虫果、伤果、畸形果。九州红家庭农场秉承“诚实守信,互惠互利”原则。泰安高新区九州红基地向来以诚信为本,因我基地自己育苗,成本低,节约开支保持真正低于同行的价格,优质的苗木及售后获得了全国各地朋友的好评!买我基地苗木与您签订合同(保证纯度、质量、成活率,切实维护您的利益),欢迎五湖四海的新老朋友前来洽谈,山东九州红愿与您真诚合作。