

丹东久久大叶红颜草莓苗九月份管理要点

产品名称	丹东久久大叶红颜草莓苗九月份管理要点
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

在开花花蕾期，迟不能晚于朵花开放，把高节位的花蕾适量摘除，定时观察鱼腥草生长情况，防止鱼腥草生长过密，出现徒长旺长等现象。发现有这种情况时，要及时将生长过旺过密的枝条摘除，然后将植株做好摘心工作，抑制植株侧枝的生长以保证剩下的花朵吸取足够的营养；疏果可使果形整齐，提高商品率，必须在幼果青色时，及时疏除畸形果、病虫果和小果。

一般在2月中、下旬开始育苗。育苗地畦宽150~200cm，沟宽35cm，沟深25cm，每畦中间种1行，也可种2行，株距80-100cm，每亩地栽母株350-450株，这个时期为了保证鱼腥草有充足的营养，要适当追肥，肥料可以使用腐熟的农家肥，控制好用量，一般在1500kg/亩。且为了提高鱼腥草的产量及品质，可以在适当的追施磷酸二氢钾等叶面肥。在鱼腥草采收的前一个月左右时，停止追肥，防止浪费肥料。种时须浅栽，并浇透定根水。成活后应及时做好施肥、灌水抗旱、排水培土、除草防虫害工作。特别是遇连续高温干旱天气，应结合浇水，将遮阳网日盖夜揭，降低温度。8月上、中旬拔除弱苗小苗和近母株的老化苗，挖掉母株苗(或摘除母株苗叶片)。厚朴现在是一中非常珍贵的植物，所以他对种植的环境要求是比较高的。种植地一般是土质疏松、土壤的酸碱度适中、含有丰富的腐殖质的砂土或壤土均可。不能在重黏土或者是排水不好的土壤中种植。8月中旬后停止施肥，控制水分，促进花芽分化。对长势旺的苗地，可进行断根处理。

选择排灌方便、保水保肥能力强，土质疏松肥沃的壤土或沙壤土做育苗田，让营养集中在根茎部位，促进根茎部位的营养积累与膨大，增强质量。并且如果种植目的不是花朵，那么在花蕾初期就应该将其摘除，减少花朵的营养消耗，防止两种生长方式并存争抢养分。种过草莓的必须进行土壤消毒。注意：大雨过后地块不能积水。