

# 早酥红梨树苗栽种，早酥红梨树苗批发价

产品名称	早酥红梨树苗栽种，早酥红梨树苗批发价
公司名称	泰安开发区荣刚园艺场
价格	4.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村（经营场所）
联系电话	05388912256 15853887025

## 产品详情

### 早酥红梨树苗栽种，早酥红梨树苗批发价

**温度** 梨树喜温，生育bai需要较高温度，休眠期则du需一定低温zhi。梨树适宜的年平均温dao度秋子梨约为4-12，白梨及西洋梨约为7-15，沙梨约为13-21。当土温达0.5以上时，根系开始活动，6-7时生长新根；超过30或低于0时即停止生长。当气温达5以上，梨芽开始萌动，气温达10以上即能开花，14以上开花加速。梨的耐寒力也不同，原产中国东北部的秋子梨极耐寒，野生种可耐-52低温，栽培种-30 -35；白梨类可耐-23 -25；沙梨类及西洋梨类可耐-20左右。在山东莱阳在梨花器的受冻临界温度，现蕾期为-5，花序分离期为-3.5，开花期1-2天为-1.5 -2，开花当天为-1.5。

**光照** 梨树为喜光果树，年需日照在1600-1700小时之间，梨叶光补偿点约为1100勒克斯(lx)，光饱和点约为54000勒克斯(lx)。

**水分** 梨树生育，需水量较多。蒸腾系数为284-401，每平方米叶面积蒸腾水分约40g左右，低于10g时，即能引起伤害。秋子梨、白梨、西洋梨类耐湿性差，沙梨类耐湿性强。在沙壤土中当土壤水分含量在15-20%较适于根系生长，降至12%则根系生长受抑制。

**土壤** 梨树对土壤的适应性强，以土层深厚，土质疏松，透水和保水性能好，地下水位低的沙质壤土为适宜。梨树对土壤酸碱适应性较广，pH值在5-8.5范围内均能正常生长，以pH5.8-7为适宜；梨树耐盐碱性也较强，土壤含盐量在0.2%以下生长正常，达0.3%以上时，根系生长受害，生育明显不良。一般杜梨要求偏碱，而沙梨和豆梨要求偏酸。一般采用嫁接繁殖。供嫁接的砧木种类较多，常用的有杜梨、秋子梨、豆梨、沙梨等。提倡适度密植，一般梨园行距不小于4-5m，株距不小于2-3m。梨树需要每年施肥，才能保证树体的健壮生长、成花和结果。未结果幼树，以施氮肥为主；结果后需要氮、磷、钾等肥料配合施用。次在萌芽前，以肥为主。第二次在新梢生长缓慢期，以磷、钾肥为主，对结果较多的植株，可再追施一次，追肥以氮、钾为主，以促进果实肥大和花芽分化。生长期内，根据叶色变化，叶面喷肥数次，前期喷氮肥，后期氮、磷、钾配合。果实采收后，还可喷肥1-2次，以加强后期光合产物的积累。梨需水量较高，一般全年灌水3-4次。

