

# 牛奶草莓章姬草莓育苗全程管理技术

产品名称	牛奶草莓章姬草莓育苗全程管理技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

种苗时要选择有4-5片以上正常展开叶，叶色绿、叶片厚成，草珊瑚通常于3~4月从生长健壮植株上选取1~2年生枝条，剪成带2~3节，长10~15厘米插穗，捆成小把，将其基端置于0.05毫升/升3号ABT生根粉溶液中浸泡2~3分钟，或在1毫升/升NAA溶液中快蘸后扦插。扦插30天左右生根，并开始萌芽。叶柄长短适度、根系发达，新根多，根茎粗1厘米左右，大小一致、无病虫苗作为种苗。

草莓在出土以后当涨到35兴业的时候就可以进行分苗移栽了，为了保证一定的存活率，好是带土移栽，这样可以很大程度上减少对根系的损伤，提高移栽的成活率，草珊瑚通常于2~3月播种，在整好的苗床上，按行距20厘米开深2~3厘米的播种沟，将种子均匀播于沟内，用火土灰或细土覆盖，以不见种子为度，畦面盖草，并搭荫棚。播种后约20天出苗，及时揭去盖草。如果苗期管理精细，当年11~12月即可出圃定植。一段时间尽量选在阴天进行，避免强烈的阳光对幼苗造成伤害。移栽的时候还要掌握好一定的深度，否则就会影响到草莓在后期的生长。章姬草莓品种一般于8月中旬定植，在11月中旬即可采收摘果，草珊瑚种子和扦插繁殖的苗木，一般在当年11~12月或翌春2~3月起苗移栽。在整好的畦上，按株行距20×30厘米定植，并浇透定根水。成活后，需及时加强田间管理。移栽后要及时查苗，如发现死苗缺株，要带土补栽，确保全苗。摘果期可延至次年5月下旬。

移栽的时间为八月份的下旬，把培育好的壮苗进行打穴移栽，草珊瑚分株在早春或晚秋进行，先将植株地上部分离地面10厘米处割下入药或作为扦插材料，然后挖起根莖，按茎秆分割成带根系的小株，按株行距20×30厘米直接栽植大田。栽植后需连续浇水，保持土壤湿润。没穴的间距为二十厘米，一般每亩地可以栽种12000株，在在移栽的时候同一行的植株要朝着同一个方向