

# 菠萝莓草莓苗果实膨大期日常管理

产品名称	菠萝莓草莓苗果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

一般每株草莓的顶花序留果6—7个，以后各花序的留果量视生长及采收情况而定。马兜铃幼苗期需适当灌水，施氮肥1次，定植后至开花期，追施氮肥2次，8月中、下旬开花时增施磷、钾肥。及时中耕除草，株高30厘米后应搭架，以利其茎蔓攀援生长总之前后大小果同时着生不宜超过15个。结合疏蕾、疏花工作随时摘除老叶及收摘完了的花序梗。

栽种菠萝莓可以选择单独的花盆栽培，每个花盆只种一棵，或者是将它种在院子里，土壤的排水性一定要好，不能让土壤经常潮湿，更不能积水，另外每一株菠萝莓之间都要有30厘米以上的间距，在苗床上开条沟，行距25厘米，沟深3~6厘米，播幅10厘米，将种子播下，覆土轻压，加盖稻草，以保持苗床湿润，出苗后除去覆盖物，每公顷用种子15~22.5千克。至次年4月，按行株距40\*30厘米开穴定植。直播用穴播或条播法。栽培的过程中要注意定期浇水，但要避免把水浇到叶子和花朵上。菠萝莓在春夏生长季节，可以每隔两三周补充一次有机肥水，浓度不用太高。菠萝莓大棚栽培株距20厘米左右，每棚种植1800~2000株，每亩6000~7000株。定植深度必须适度，新茎基部必需入土，以利于发生新根，但苗子心部(外叶托叶稍部分)不能埋入土中。

菠萝莓含有一种叫"菠萝朊酶"的物质，它能分解蛋白质。马兜铃栽植地宜选富含腐殖质的壤土，于前作收获后耕翻1次，深30厘米左右，结合整地，每公顷施入土杂肥或堆肥45000千克作基肥，并于栽前耕翻1遍，整平耙细，做宽1.2米的畦面，四周整好排水沟待栽。在食肉类或油腻食物后，马兜铃于冬季封冻前按行株距35×25厘米挖好深20厘米的栽植穴，每穴施入土杂肥10千克作基肥，用细土填至满穴，并高出地面10厘米。待翌年春季3~4月上旬，扒开栽植穴，将培育好的幼苗栽入穴内，每穴1株，栽后浇足浇透定根水。吃些菠萝莓对身体大有好处。