

# 丹东99大叶红颜草莓苗果实膨大期日常管理

产品名称	丹东99大叶红颜草莓苗果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

定植时要求带土移植，每畦双行定植，株距为20cm，每667m<sup>2</sup>栽6000株左右，枸骨可于9~10月间采下成熟种子，种子要后熟3个月才能发芽，用沙层积贮藏，于翌年3~4月播种，出苗率较高。枸骨具彩色斑纹的变种，实生苗会出现返祖现象而叶色变成绿色。定植后及时浇透水；栽苗时应注意草莓苗弓背新茎方向朝沟；有的草莓在外形上与丹东草莓相似，但味道却差很多，那很有可能是普通草莓。下面教您四招分辨丹东草莓。

温、湿度调控萌芽至现蕾期，白天温度控制在15-20摄氏度，夜间8摄氏度左右，枸骨硬枝、嫩枝扦插均可，一般于雨季节进行嫩枝扦插，成活率高。插条剪自结果丰富、生长健壮的植株上，长12~15厘米，插深8~10厘米，插后遮荫保湿。为促进生根，提高插穗的繁殖效果，在扦插前对插穗要进行一定的处理，有条件的话扦插时采用ABT2号生根粉，可大大提高生根率。内棚夜间温度高于5 时可拆除内棚，棚温高于30 时应及时进行单边或双边揭膜降温定植时间为9月中、下旬，采用双行三角形种植法，行距30 cm，株距10-15cm，每667m<sup>2</sup>栽12000-15000株，10月下旬盖棚膜，开花之前盖好黑色地膜。丹东草莓，柔软的外皮包裹着脆坚的果肉，轻轻一按便会留下痕迹，拿在手上就会有一股专属于草莓的甜香扑鼻而来，让人一闻就忍不住咽口水

当子苗长出一叶一心时，可用压苗器及时压苗，减少浮苗。枸骨嫁接繁殖主要用于叶片具彩色斑纹种类的繁殖，通常于春季萌芽前进行，以枸骨为砧木，采用切接法或芽接法，成活率高。注意压苗要轻，仅将子苗固定住即可，同时压苗前应当摘除子苗下部小叶。