

波姬红无花果苗、波姬红无花果苗价格

产品名称	波姬红无花果苗、波姬红无花果苗价格
公司名称	泰安开发区利群苗圃
价格	4.00/棵
规格参数	品种:波姬红无花果苗批发 规格:1.5米以上 产地:泰安开发区利群苗圃
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13561766718

产品详情

波姬红无花果苗、波姬红无花果苗价格

波姬红无花果是国内鲜果种植的红色无花果品种，自从2007年无花果在国内得到飞跃式发展后，全国从黑龙江到海南省均有种植此品种，通过几年来的市场观察，波姬红不管从外观还是口感上得到消费者们的认可，当年新生芽一节开始挂果，具有极高的丰产性，单果重达70克左右。

无花果繁殖容易，管理简单，结果早而病虫害少，栽植后2~3年即可开始结果，7~10年可进入盛果期，无花果种植无花果具有较好的经济效益，怎样种植无花果成为广大新种植户关注的问题，下面为大家介绍一下无花果栽培关键技术。

无花果功效

无花果果实柔软味甜，具特异风味，富含易为人体吸收的果糖和葡萄糖，胡萝卜素和维生素C的含量也比较高，且含有多种消化酶，能帮助消化，是一种很好的保健果品。同时中医认为，无花果果实性味甘、平，具开胃、润肠、消炎、解毒、催乳、止痢和治痔疾等多种功效。民间应用偏方甚多，常以枝、叶、根、果入药。

环境要求

温度：无花果正常发芽所需的温度为15 以上，低于15 发芽缓慢、不整齐；

水分：建立丰产园应尽量做到旱能浇、涝能排，以提高产量和品质；

土壤：无花果对土壤适应性特强，沙土、壤土乃至各种粘重土壤均可栽培，但适宜的为土层深厚的中性或偏碱性的沙壤钙质土。

栽培技术

为防止冬季干枯和早春低温冻害，以春栽为好。3月上中旬栽植适宜。也可秋栽，落叶后立即起苗定植，但冬季应注意培土防寒。定植密度可根据整枝方式、是否设施栽培来定。一般行株距为3米×2米，亩栽11株。苗木栽植时应挖松定植点50厘米见方土层，作10厘米深穴。先修剪受损根和过长侧根进行消毒处理，然后将苗木根系均匀分布在穴中，填土提苗踩实，培土至嫁接口，团作80厘米见方的树盘，树盘略高于地面15~20厘米，灌足底水，然后用1米见方的地膜覆盖树盘。

肥水管理

基肥：基肥一般在落叶后的11月中旬~12月上旬，以施厩肥为佳。成年树的需要量，一般每亩施厩肥4000~6000公斤。施肥方法可在行间或株间，开出宽30厘米、深30~50厘米的施肥沟，施入基肥。

追肥：无花果第1次追肥应在新梢旺长时的5月，以氮肥为主，每亩施用量14~20公斤。在果实成熟期的8~10月，应追肥2~3次，以复合肥为主，每次每亩用量16~20公斤。施肥方法与基肥相同。

灌排水：无花果根系发达，一般不需浇水，但天气特别干旱时应及时给果园浇水，以补充水分。如降雨过多，要注意及时排除积水以保持果实糖分，防止造成裂果。