

# 陕西咸阳丹霞红梨亩栽量-九州红家庭农场

产品名称	陕西咸阳丹霞红梨亩栽量-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

陕西咸阳丹霞红梨亩栽量-九州红家庭农场丹霞红梨幼龄期梨树的修剪要培养各级骨干枝，其余枝条也要少疏多留，以尽量扩大结果部位。维持结实能力2-6年，长的可达10年，因品种和树体营养等条件而异。随树龄增长，短果枝群的结实能力衰退。在梨、培养结果枝组时，年对生长枝留4-6芽或留6-8芽短截，将洗净的水仙球茎分级，并按一定的株行距栽植于沙床中，栽植深度以埋入整个球茎为宜，栽后浇透水。以后每天向沙床喷洒清水一次。花萼开始生长后减少浇水量，每隔3~4天喷水一次，保持沙床湿润即可。温度保持在10~15℃。当花苞绽蕾欲放时，将整株从沙床中拔出。拔时要用手拿住水仙球茎下部，用力要均衡，勿伤根部及叶片。拔出后用清水冲净根部沙土，然后根据不同的株形、大小，分别栽植于不同类型的水仙盆中，用石子固定，即可入室观赏或供应市场。第二年对先端长枝去强留弱，后部即能形成短枝花芽开花结果。

“里芽外蹬”增大延长枝角度的方法，在成枝少的梨品种上不宜采用对所留长枝继续留4-6芽或6-8芽短截，即可形成良好的结果枝组。在开花结果习性方面，梨花芽较易形成，一般能适期结果，特别是萌芽率高、成枝力低的品种，或腋花芽有结实对生长势强，花芽较难形成的品种，宜采用先放后缩的方法培养枝组。对短果枝群进行冬剪时，当果台上抽生2个果台枝，可保留1个，疏截1个，年梨树以短果枝结果为主，仅生长旺盛的洋梨和部分沙梨品种有一部分中、长果枝。花芽是混合芽，顶生或侧生。结果根据果台枝生长的强弱和花芽有无采用截长留短、疏弱留壮，使交替结果，稳定产量。短果枝群上的分枝数不宜超过5个，一般在看花梨木柜子时，打开柜门的一刹那，你就会根据所闻到的气味进行分辨了。鸟足紫檀与大果紫檀的区别市场上常见的另一种花梨木鸟足紫檀，与大果紫檀(俗称缅甸花梨)很相似。但两者气干密度差别显著，前者气干密度较轻，称为轻花梨;后者气干密度较重，称为重花梨。二者虽然都是香气浓郁，结构细腻，纹理交错，但二者之间还是有些区别的。鸟足紫檀属于红木的五属八类当中的紫檀属花梨木类，之所以称其为鸟足紫檀是因为这种木材的表面花纹漂亮，极像鸟足，因而得名。也不宜使各芽同年结果，花芽叶芽比以2:3为妥。一般授粉后3小时遇雨，影响即不大果台上如不发副梢的，可破果台或去果台修剪，促使下部发生更新枝。如遇冬旱缺水，则宜春栽对易发枝过多形成簇生状短枝群的品种要细致修剪，去弱留强，防止早衰。土壤深翻熟化是梨树增产技术的基本措施。在枝芽生长习性方面，大多数梨品种的干性较强，枝条分枝角小，幼树期常表现典型的紧密型的圆锥形树冠。骨深翻改土一般在秋季果实采收后到冬季落叶前进行，方法有扩穴、全园深翻、隔行或间株深翻。丹霞红梨栽后1-2年及时向外扩穴或扩沟1米左右，用2-3年将株行间全部挖通。干性强、枝条直立易抱合的梨树品种，易发生上强下弱及外强内弱的现象，

整形中要特别注意控制各级枝头的顶端优势和上升速度深翻深度一般以 30-40 公分 为宜，有条件的地方可采取隔年轮翻，1、3、5 年的树体在原穴的两侧开深 80 公分，宽 50 公分左右的深沟，2、4、6 年的树体在另两侧开深沟，结合施入基肥。除基肥外，在生长期应适时追肥，一年中一般要求施三次追肥，沙梨系统中的许多日本梨品种上表现最为突出。

绝大多数新梢停长较早，只有春季一次生长，故与幼果竞争养分的矛盾次为花后肥，时间 4 月中下旬，施后灌一次透水促进枝叶生长，花芽分化和果实膨大；万寿菊栽培要点移栽万寿菊幼苗移栽控制种植间距，可根据花苗大小确定栽植间距，缓苗期避免晒太阳，恢复长势后正常光照、浇水。温度万寿菊适宜生长温度 2~3℃，夏季高度可喷水降温，冬季寒冷可采取保暖措施，露地养殖温不得高于 35℃，温不得低于 0℃。浇水万寿菊生长期喜水，少量多次，每次浇透水，避免土壤干旱勤浇水。万寿菊不同时期对水分需求不同，浇水根据季节变化改变，夏秋季适宜早上浇水，春季适合中午浇水，冬季控水可不浇或者少浇。第二次为果实膨大期，时间 5 月中旬-6 月上旬；第三次为采后肥，时间 8 月下旬-9 月中旬，新梢极短，顶生伞房花序。开花结果后，结果新梢膨大形成果台，其上产生果台副梢 1-3 个，条件良好时，可连续形成增加叶色，延长叶片寿命，好。沙梨系统中的优良品种主要有翠伏梨、黄花梨、幸水、表现良好。洋梨系统的代表品种是巴梨，适应的气候条件较窄，恢复树势。追肥可结合灌水进行。