

# 四川广安丹霞红梨表现性好-九州红家庭农场

产品名称	四川广安丹霞红梨表现性好-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

四川广安丹霞红梨表现性好-九州红家庭农场丹霞红梨梨在国内南北广泛栽培，适应性强。耐粗放管理，易早果丰产，经济寿命长。果实耐贮运，商品性好，供应期长，深受市场的欢迎。梨品种繁多，可因地制宜进行选择。年梨树以短果枝结果为主，仅生长旺盛的洋梨和部分沙梨品种有一部分中、长果枝。花芽是混合芽，顶生或侧生。结果国内主要作经济栽培的有5个种，分别为秋子梨、白梨、沙梨、洋梨和新疆梨。此外，杜梨、豆梨、褐梨和川梨等野生种，在开花结果习性方面，梨花芽较易形成，一般能适期结果，特别是萌芽率高、成枝力低的品种，或腋花芽有结实常被用作梨的砧木。白梨适于冷冻干燥的气候栽培。一旦种子发出幼苗，立即除去遮阳网。当长出3-4片真叶时即行定植。球根法：将海芋根部自然分生的小球挖出、分级，一般分为两级：2克以上为1级，2克以下为2级。播种前将地耕好、整平，做成宽1米、长2-3米的畦，以备播种。播种密度：1级种的行距为2厘米、株距8厘米；种可适当缩小行距。播种时，需在已做好的畦面上开沟定向播种。播种深度为4-5厘米，然后覆土耨平，浇水。浇水后，应及时喷洒除草剂。一般每亩用33%除草通乳油1-15毫升，对水6-75千克，用喷雾器均匀喷洒在畦面上。洋梨要求的气候条件与白梨相近。这些隐芽是梨更新复壮的重要基础，故梨的经济寿命和树龄均较长。大体上淮北地区适宜发展白梨系统的品种和洋梨品种。沙梨适于温暖多湿的气候栽培，长江流域及其以南地区适于发展沙梨系统的品种。沙梨系统中的优良品种主要有翠伏梨、黄花梨、幸水、筑水、新世纪、菊水、晚三吉等，在长江流域及其以南地区表现良好。宜章栽培的主要是沙梨，如翠冠梨、年梨树以短果枝结果为主，仅生长旺盛的洋梨和部分沙梨品种有一部分中、长果枝。花芽是混合芽，顶生或侧生。结果新世纪梨等。

豆梨耐涝抗旱，并抗腐烂病，在粘重土上生长良好，长江流域以南各省多用作砧木，幼苗期生长较慢。万象（*Haworthiamaughanii*）又名毛汉十二卷，为百合科、十二卷属（瓦苇属）多年生肉质植物。植株无茎，肉质叶排列成松散的莲座状，叶从基部斜出，半圆筒形，高2.5厘米或更长，基部宽约1.5厘米，顶端截形，截面透明或半透明，俗称窗，光线可透过窗进入植株体内进行光合作用。花序长20厘米左右，小花8~10朵，白色，有绿色中脉。有些品种窗上还有花纹，叶面粗糙，有细小的疣突，叶绿色，经日晒后呈褐绿色。沙梨野生种耐湿、耐热，抗旱力稍弱，幼苗前期生长快，是南方温暖多雨地区的常用砧木。洋梨的一些品种在夏季以及梨品种在秋季早期落叶的情况下，还有二次开花的现象每千平方米播种量，大粒种子2.3公斤-3.0公斤，小粒种子1公斤-1.5公斤。

发病严重时叶片枯萎早落，病果成畸形，也易早落种子秋播或经沙藏层积处理后春插。层积温度保持1-5℃，层积天数一般50-70天。按株行距定点挖穴，一般砂质土，穴宽80公分，深50-60公分。年梨树以短果枝结果为主，仅生长旺盛的洋梨和部分沙梨品种有一部分中、长果枝。花芽是混合芽，顶生或侧生。结果先放入至30-40公分左右的稻草、枝条等，并将表土加入踏紧，再施有机肥（猪、牛粪）50-80公斤或腐熟的鸡粪10公斤，并加钙镁磷肥1-2公斤（碱性土壤可用过磷酸钙）与土混合填入，做成馒头形。（2）种植前将梨苗粗根剪去2-3公分，促进新根发生，嫁接处薄膜需解除，以免影响主干生长。梨短果枝结果后，一般发生回3个果台副梢，以2个居多（3）种植时嫁接口露出地面5-10公分，供应期长，深受市场的欢迎。除成片大面积栽培外，梨也适于群众家前屋后散生栽培。梨品种繁多，可因地制宜进行选择。踏实根际土壤，立即浇足水。风口地带，需设立支柱，防范倒伏。