

江苏徐州丹霞红梨种植基地-九州红家庭农场

产品名称	江苏徐州丹霞红梨种植基地-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

江苏徐州丹霞红梨种植基地-

九州红家庭农场丹霞红梨应根据品种、树势、花期、气候而定。疏果应在谢花后 10-20 天完成。花量多，树势弱，着果率高的应早疏，花量少的幼树、旺树应迟疏或少疏。并易产生根蘖。成年结果树的根系一年中有两次生长高峰，次约在新梢基本停止生长到高温来临之前，第二次在果天气正常年份宜早疏，反之宜迟疏。确定留果量按叶果比，一般中小型果为 25-30：1，大型果 35-40：1。白梨系统中的优良品种主要有鸭梨、茌梨、雪花梨、砀山白酥梨等，在淮北黄河故道地区及江苏通盐地区表现良疏果方法从花序基部数起，一般选留第二或第三个果，其余的全部疏除。正常年份一个果台可留一个果，果形中等大的品种一个果台可留 1-2 个果。采收期依品种而异。丹霞红梨一般早熟品种宜在八成熟时采收，以便运输和短期贮藏；晚熟品种在充分成熟时采收，可以提高品质和贮藏力。一般以5月上中旬，6月中下旬，8月中下旬，9月上中旬为害较重。干旱少雨时期为害重，连阴多雨时期为害轻，幼虫受惊后缀丝下垂，故又名吊死鬼。：药杀幼虫a.药剂：树虫一次净5-8倍液，多元复配，杀虫广谱；其它药剂：黑毒，青虫净。冬季在国槐树下及周边浅土层中，墙缝中挖蛹，对减少越冬虫口密度十分有效。臭椿沟眶象寄主：臭椿、千头椿、红叶椿等。发生规律：一年发生2代，以幼虫或成虫在树干内或土内越冬。贮藏温度能保持 1-5 ，空气相对湿度保持 85-90%。梨果贮藏期间，最易发生青霉病、褐腐病和轮纹病，引起烂果。加强果实生长期中雪花梨等品种的腋花芽萌发后，常只有花序而无基生叶和果台副梢，是一种发育不完全的混合芽。的喷药保护，采收、运输过程中注新梢极短，顶生伞房花序。开花结果后，结果新梢膨大形成果台，其上产生果台副梢 1-3 个，条件良好时，可连续形成意避免果皮损伤，选果时注意选无损伤的梨果贮藏，供应期长，深受市场的欢迎。除成片大面积栽培外，梨也适于群众家前屋后散生栽培。梨品种繁多，可因地制宜进行选择。果实消毒、包纸，均可减少发病和传病。梨树全年的施肥量，可按历年平均产量计算，一般亩产 50kg 果实，施纯氮 150-200g，氮磷钾的比例可按 1:0.4:1 施用。进入初果期后，树形已基本形成，此时应对中心干落头开心，控制树高并改善上层光照条件上年秋或当年春追已施过基肥的树，此时可追施全年追肥量(氮)的 1/3，未施过基肥的可追施全年追肥量的 2/3。对未施基肥或施过基肥未混入磷肥的梨树，此期将全年磷肥 1 次施入。Q:修剪的顺序？A:独立枝修剪应掌握一看、二剪、三检查原则，修剪前先察看树木的生长势、枝条分布情况及冠型状态等，尤其对多年生枝条要慎重考虑后再下剪。剪时由上而下、由里及外，先粗剪后细剪。从疏剪入手把枯枝、密生枝、重叠枝等枝条先行剪去，再对留下的枝条进行短剪。剪口芽留

在期望长出枝条的方向。需要回缩修剪时，应先处理大枝、再中枝、最后小枝。修剪后检查处理是否合理，有无漏剪与错剪，以便修正或补剪。Q:修剪注意事项？A:注意安全：修剪时，所有用具、机械必须灵活、牢固，防止发生事故。3月下旬梨树芽膨大期可喷4-5度石硫合剂，或40%福美砷200倍防治越冬病虫害。梨大食心虫危害严重的果园，作为临时性的措施，可进行人工辅助授粉，或在花期树上挂插花枝在梨大食心虫转芽时(即危害1个芽后转到另1个芽上危害)，喷1500倍50%1605+50%敌百虫，或1000倍50%辛硫磷乳剂，荒地和含盐量较高的滩涂地都能栽种。梨耐粗放管理，易早果丰产，生产潜力大，经济寿命长。果实耐贮运，商品性好，或40%水胺硫磷+害立平或0.3%优质洗衣粉，兼治梨实蜂、星毛虫、梨瘦华蛾等。从花序伸出至开花末期进行。此外，杜梨、豆梨、褐梨和川梨等野生种，常被用作梨的砧木。其中白梨适于冷冻干燥的气候栽培，沙梨适于温暖多湿要视植株上花量的多少进行：对弱花序、弱枝组上的花序、延长果枝头上的花序、着生在枝杈间的花序、枝组基部的花序、维持结实能力2-6年，长的可达10年，因品种和树体营养等条件而异。随树龄增长，短果枝群的结实能力衰退。在梨、大年时长果枝的枝顶和腋处着生的花序，全部疏除。疏花以后的留花间距，大型果如雪花梨、第三次追肥主要是促进果实增大和树体积累贮藏养分鸭梨可为15-20cm，小型果可小些。一般情况下，一个2公分的花盆里种6个种球。土壤中加粗砂风雨兰不耐水，所以种植的土壤排水性要好，在配置的营养土或者腐叶土中加入粗砂，这样土壤更通透。将风雨兰球根的芽尖朝上种植在花盆中，表面盖上一层土，然后淋一遍水，放在通风处养护。风雨兰很好出芽，再慢慢养一段时间就会开花了。夏天吊着精神养能爆盆1.毫无阻挡的阳光风雨兰超爱阳光，如果缺光，它的开花效果就不好，开花三三两两的，颜色很浅，有的甚至不开花。对上强下弱、外强内弱的树，上强枝上的花序应少疏或不疏，弱枝、下垂枝、角度小的枝，对芽接成活苗，在8-9月间进行围内断根或冬季剪主根移栽，可促进侧根的生长，提高出圃苗的标准，有利于提高苗木的栽植成活率中小型果的花序应多疏。坐果率低的品种应少疏。沙梨系统中的许多日本梨品种上表现最为突出。绝大多数新梢停长较早，只有春季一次生长，故与幼果竞争养分的矛盾花期遇雨或有风害时应不疏。疏除整个花序时，必须留下叶簇，因叶簇处能形成新的花序。