

# 小叶红颜草莓苗不同培育期水管理要点

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 小叶红颜草莓苗不同培育期水管理要点 |
| 公司名称 | 泰安市龙烁苗木有限公司       |
| 价格   | 5.00/棵            |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区         |
| 联系电话 | 15166482777       |

## 产品详情

温室草莓定植时间一般为8月末--9月10日之间(假植苗可在9月末以前)。危害柑桔的病原菌和虫源都在枯枝落叶、杂草、落果中越冬，所以在冬初时就啊哟及时将病虫枝、干枯枝、落叶落果以及杂草及时清理出果园，集中烧毁或者深埋。定植前一周，整地施肥，结合翻地亩施充分腐熟的农家肥3 - 5t,氮磷钾复合肥或草莓专用复合肥50kg，深翻30-35cm，与土壤充分拌匀。在长春地区,当旬平均气温稳定在5~19 时,为了柑桔的花芽分化，提高花芽质量，增加树体营养，提高抗冻能力，必须早施基肥，在结果树采果一周后即可施肥，幼树在11月前必须施完。肥料施得越早，气温越高，那么肥料的分解速度就会越快，树体吸收也能吸收的更多，这样效果更佳。这时施肥以有机肥为主，搭配果树专用肥，采用环状沟和条沟法施入。早熟品种经20d左右、中熟品种经25d左右能进入花芽分化期;草莓在30 以上的高温时则不能形成花芽,在9 下的低温经 10d即可成花,此时的花芽形成与昼长无关。在草莓薄层营养液栽培时,营养液温度可影响草莓的花芽分化。叶少平等[9]研究发现,在遮光的条件下,溶液采取20、25 冷却处理,次腋花芽分化期分别提早12、6d,果实采收期分别提前23、1d。

一般每 7 ~ 15d 利用滴灌对母株追施富含腐殖酸的高氮复合肥。同时在秋末时就要将晚秋梢全部剪除，防止晚秋梢延伸生长，降低树体抗寒性。如果土壤水分过多，根系极易腐烂，所以可以结合施肥开沟排湿，以免日后管理。控制繁殖系数在 30 左右，同时保证子苗有 5 片以上功能叶子，使其成为优良的生产苗母株。