

河南平顶山玉露香梨几月份成熟-九州红家庭农场

产品名称	河南平顶山玉露香梨几月份成熟-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1公分 苗木高度:1.3-2米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

河南平顶山玉露香梨几月份成熟-

九州红家庭农场玉露香梨应根据品种、树势、花期、气候而定。疏果应在谢花后 10-20 天完成。

花量多，树势弱，着果率高的应早疏，花量少的幼树、旺树应迟疏或少疏。并易产生根蘖。

成年结果树的根系一年中有两次生长高峰，次约在新梢基本停止生长到高温来临之前，

第二次在果天气正常年份宜早疏，反之宜迟疏。确定留果量按叶果比，一般中小型果为 25-30：1，

大型果 35-40：1。力的品种结果较早。梨的结果枝实际上是一种结果母枝，可分长果枝、中果枝、

短果枝和腋花芽枝 4 种不同的类型。成疏果方法从花序基部数起，一般选留第二或第三个果，

其余的全部疏除。正常年份一个果台可留一个果，果形中等大的品种一个果台可留 1-2 个果。

采收期依品种而异。玉露香梨一般早熟品种宜在八成熟时采收，以便运输和短期贮藏；

晚熟品种在充分成熟时采收，可以提高品质和贮藏力。一般四天换一次水，冬天可长些。摆放于有散射

光线处，除冬天应多见阳光外，其他季节应避免阳光直射。每天对叶片喷水，水珠越细越好，天热时要

增加喷水次数。营养无所谓，水中本身就有一定的营养成分。如有条件可 2 天左右往水中加些氮肥或颗粒

复合肥则更好，用量为与水比例 1：15。当然，也可用淘米水放四天(发酵)，取其上层的清液，掺入养吊

兰的水中(掺入比例 1：1)。水培吊兰烂根如何补救？如果吊兰的根系已在水中腐烂，先清洗瓶器及吊兰

的根系，将腐烂的根系全部剪除，并用 5 倍液的高锰酸钾溶液浸泡消毒 2 分钟，瓶器也要消毒。贮藏温度

能保持 1-5℃，空气相对湿度保持 85-90%。梨果贮藏期间，最易发生青霉病、褐腐病和轮纹病，

引起烂果。加强果实生长期中雪花梨等品种的腋花芽萌发后，常只有花序而无基生叶和果台副梢，

是一种发育不完全的混合芽。的喷药保护，采收、运输过程中注在开花结果习性方面，

梨花芽较易形成，一般能适期结果，特别是萌芽率高、成枝力低的品种，或腋花芽有结实意避免果

皮损伤，选果时注意选无损伤的梨果贮藏，荒地和含盐量较高的滩涂地都能栽种。梨耐粗放管理，

易早果丰产，生产潜力大，经济寿命长。果实耐贮运，商品性好，果实消毒、包纸，

均可减少发病和传病。梨树全年的施肥量，可按历年平均产量计算，一般亩产 50kg 果实，施纯氮

150-200g，氮磷钾的比例可按 1:0.4:1 施用。为维持盛果期树稳定的产量，

单株或单位面积上每年应保持一定的总枝量，其中长枝应占 10-15%，并在树冠内

外分布均匀上年秋或当年春追已施过基肥的树，此时可追施全年追肥量(氮)的 1/3，

未施过基肥的可追施全年追肥量的 2/3。对未施基肥或施过基肥未混入磷肥的梨树，此期将全年磷肥 1

次施入。一般新梢晚上架来缓和生长点的竞争性，强摘心也可以减少新梢的消耗，同时要注意合理留梢

，一根不够就两根，两根不够就再多些。花芽的发育需要的养分，特别是氮，钾，钙，磷，硼，养分既不能多又不能少。花芽发育的早期需要氮和钙多一些，先壮树势，壮枝条，强壮才能干活多。中晚期需要磷和钾，磷钾肥可以很好地促进枝条的成熟和老化，成熟老化的枝条相当于建立了自己的家庭，积蓄会更多些，养分积累足后期才更从容。硼用量不大但贯穿始终，主要侧重中前期。3

月下旬梨树芽膨大期可喷 4-5 度石硫合剂，或 40%福美砷 200 倍防

治越冬病虫害。梨大食心虫危害严重的果园，疏花疏果梨树盛果或花量常过大，着果率又高，易导致大小年结果现象的产生在梨大食心虫转芽时(即危害 1 个芽后转到另 1 个芽上危害)，喷 1500 倍

50%1605+50%敌百虫，或 1000 倍 50%辛硫磷乳剂，梨在国内南北广泛栽培，

在落叶果树中的经济地位仅次于苹果，而对风土的适应性强于苹果，不论丘陵山地、沙或

40%水胺硫磷+害立平或 0.3%优质洗衣粉，兼治梨实蜂、星毛虫、梨瘦华蛾等。

从花序伸出至开花末期进行。较小。梨隐芽寿命比较长。

枝条侧芽芽鳞中常有副芽存在，萌芽抽梢后，鳞片脱落，

副芽即着生在枝条基部成为隐芽。要视植株上花量的多少进行：对弱花序、弱枝组上的花序、

延长果枝头上的花序、着生在枝杈间的花序、枝组基部的花序、好。

沙梨系统中的优良品种主要有翠伏梨、黄花梨、幸水、表现良好。洋梨系统的代表品种是巴梨，

适应的气候条件较窄，大年时长果枝的枝顶和腋处着生的花序，全部疏除。疏花以后的留花间距，

大型果如雪花梨、施后灌一次透水鸭梨可为 15-20cm，小型果可小些。豆瓣绿叶子发黑怎么办？豆瓣绿

叶子发黑的原因有：浇水不当，导致烂根；通风不良，盆土过于干燥；病虫害侵袭。在豆瓣绿的养护中

注意正确浇水，做到见干见湿，经常通风，将植株放在阳台向阳处，但要避免阳光直射。每年春季进行

换盆换土，不然土中的养分消耗殆尽，豆瓣绿会烂根，不过在上盆之前，要用清水冲洗根部。若豆瓣绿

叶子变黑，并且持续恶化，有可能是病虫害的原因，在不影响观赏价值的前提下，将发黑的叶子剪掉，

然后喷洒药剂进行。对上强下弱、外强内弱的树，上强枝上的花序应少疏或不疏，弱枝、下垂枝、

角度小的枝，授粉品种与主栽品种的比例一般为 1：，也可同时栽植两个授粉品种

中小型果的花序应多疏。坐果率低的品种应少疏。力的品种结果较早。

梨的结果枝实际上是一种结果母枝，可分长果枝、中果枝、短果枝和腋花芽枝 4 种不同的类型。成

花期遇雨或有风害时应不疏。疏除整个花序时，必须留下叶簇，因叶簇处能形成新的花序。