

树莓苗移栽后需水原则介绍

产品名称	树莓苗移栽后需水原则介绍
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

树莓果是纤维素含量高的果品，这有助于防治心脏病，在防治病虫害、除草以及施肥过程中，因为操作不当而造成植株发生药害或者肥害，都会造成人参果卷叶现象。还有可降低血液中胆固醇，可溶性纤维素也有助于防治糖尿病，降低二氧化碳进入血液，以维持血液中葡萄糖的水平。

红树莓品种中除了耐寒性极强外，有的还可以在亚热带高海拔地区如昆明、或青藏高原的河谷中栽培。红树莓有黄、紫色等变异品种，但同归一宗。春秋两季都可栽培。树莓一年生茎可以越冬，第二年结果后干枯衰亡，然后又萌发新茎。“树莓既适宜成片种植，也适合田边荒坡零散种植。树莓的适应性很强，在喷施叶面肥和农药时一定要注意浓度和时机，要严格按照要求的浓度配药和配肥，不宜在强光暴晒的正午进行喷肥喷药。对土壤要求不严格，抗病能力强，栽培较为粗放，省工节水，生产管理成本低。”杨拴让说。

树莓花朵的美不仅仅在色彩，也美在香味。悠悠香味来自花瓣中的油细胞，在高温期要加强温度调控，以免温度过高而引起卷叶，尽量控制温度不要超过30度，一旦超过30度，将不利人参果的生长发育。其中的芳香油分泌后挥发到空气中，于是浓浓的香气在空气中飘来游去。当艳阳高照、温度升高的时候，花瓣中的芳香油挥发得更快，飘得更远，所以香味便更加浓郁。