

# 天仙醉草莓苗移栽后需水原则介绍

产品名称	天仙醉草莓苗移栽后需水原则介绍
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

适时疏蕾、摘叶、摘除匍匐茎。即将无效的高层次花，施肥过多是很多种植户都存在的一个问题。很多人觉得肥料越多的话，便能够为茄子生长提供越多的营养。而其实施肥过多的话，会导致土壤溶度过高。茄子的根部容易出现反渗透现象在花蕾分散期适量疏除。去除老叶、残叶、病叶和多余匍匐茎，以减少养分消耗，提高果实质量。

在草莓现蕾至开花时期,可喷施叶面肥2~3次,使用浓度为6%的高锰酸钾和钼酸铵的混合液,或用3%的硼酸液,时间选择在下午4点后喷施。很多种植户在种植茄子的时候,都会觉得如果茬次越多的话,那么茄子的产量就会越多,效益也会越高。而其实是茄子结果茬次越多的话,那么效益反而还会受到影响下降。因为茄子是有一定生长规律的,如果茬次过多的话,营养消耗多,从而会影响下茬的生长。因此我们在种植的时候如果是越冬栽培的话,要以越冬大茬栽培为主,一年一茬便可。如果是春秋栽培的话,则一年两作。每年在夏季的时候土壤要进行深翻雨淋,将土壤熟化,进行灭菌杀虫工作,才能保证茄子产量及效益。也可喷施氮、磷、钾溶液0.3%~0.6%,每周1次,可增产15%~25%。使用多维转运蛋白(草莓需配)叶面肥,30克一桶水叶面均匀喷施,4g花千果配5g多维转运蛋白(草莓需配)冲施肥随水冲施一至两亩地。可提高草莓的座果率,起到膨果的作用,而且可以减少草莓畸形果的发生,增加草莓果实的密度,提高草莓的产量。

温室内一般禁止使用煤火加温,以防受到有害气体的危害。导致植株枯死,产量也会因此受到影响降低。尤其是在温室中,高温高湿的环境,有机物质分解速度快,有效磷的含量也要多于露地,施肥过多的话容易导致肥害。雨雪天要及时清扫棚膜和草苫(保温被)上的积雪。