

# 佐贺清香草莓苗不同培育期水管理要点

产品名称	佐贺清香草莓苗不同培育期水管理要点
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

在茬果子采收之后的这段时间，一定要注意好，早春栽培的大棚番茄，在坐果后应该及时浇水，以满足期对水分的需求，冬暖型越冬番茄一般在10月浇足定植水，及时中耕划锄保墒，直至坐果前如无特殊情况无需浇水，浇水以小水为主，以免地温大幅度降低，坐果后要及时浇水，以满足果实对水分的需求。赶紧给他冲一些水溶肥，让它的根系得到更好的修复，这个时候也是新老根系交替的时候。

草莓花芽分化需较低温度和短日照，可在遮阳网上加盖草苫（草帘），通过揭与盖草苫的操作过程，人工造成短日照的条件及较低温度，促进顶花序和腋花序的分化，番茄在发芽期要求土壤相对湿度在80%左右，因为种子在发芽过程中需要吸收大量的水分，幼苗期要求土壤相对湿度在60%左右，这时要控制水分，有利于根系生长发达。但是如果过于干旱，也会影响到花芽分化，一般是定植后控制浇水，但是不宜过度，低不宜低于60%。一般而言，番茄边定植边浇水，定植3-5天后再浇一次缓苗水，直至到果实蛋黄大小时再浇水一次。随着植株生长发育，如果结果数量多，通风量增加，蒸腾量也会加大，这时要控制湿度在75-80%左右，增加浇水量和浇水次数。时间有月余，此阶段应保持每周对苗进行施两次薄肥，并进行浇水，分化期后，撤除遮阳网，在草莓的正常生长温度下，土壤湿度应在70%-80%

为宜，棚内空气湿度以60%-70%

为好，因此，当棚内气温超过30 时，应通风，同时对苗上进防治，避免虫害，此阶段保持每月3次施肥，每次施一次钾肥、磷肥以及尿素的复合肥，保证生长营养；

为防止栽后太阳曝晒，在供足水份的同时，可用苇帘、塑料纱、植株叶片深绿且带有光泽，心叶舒展，这时均匀适宜的表现；如果心叶皱缩不展，叶色浓绿，在晴天有轻度叶片下垂的症状，那么就是缺水表现，需要及时浇水。心叶过度舒展，叶大而薄，叶面吐水过多，是水分过多的表现，应控水防徒长。带叶的细枝条和蒿草进行遮荫，有条件的可采用塑料遮阳网。