

锦绣海棠苹果苗品种大全及简介

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 锦绣海棠苹果苗品种大全及简介 |
| 公司名称 | 泰安市龙烁苗木有限公司 |
| 价格 | 5.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区 |
| 联系电话 | 15166482777 |

产品详情

覆盖是减少地面水分蒸发的根本措施，可充分利用麦草、杂草等对果园进行树盘覆盖，在茄子苗期的时候，我们还要做好间苗工作。通常整个苗期要间苗两次左右，首先应在分苗前进行。在幼苗长出大约两片子叶的时候，进行次间苗。要将生长过密的幼苗疏开，每个健壮幼苗之间的间距应保持在大约一厘米左右果园此期杂草丛生，不要急于进行除草可利用杂草的覆盖，保水并减缓水分蒸发，减缓干旱的危害。

可以缓和树势，利于花芽分化。方法主要有拉枝、撑枝、别枝、里芽外蹬、背后换头等。在播种的时候，我们是需要覆盖一层细土的。然后再茄子的苗期的时候，我们还要注意做好分次覆土工作。一般在茄子种子顶土出苗以及幼苗齐苗之后都要适当覆土。除此之外，每次间苗和浇水的时候，都是要适当覆盖一层细土的。在覆盖细土之前，我们首先都需要提前准备。应将覆盖的细土放在温室中预热之后使用，然后还要注意覆土厚度，不可过厚，应保持在大约0.2厘米左右。拉枝时间宜在树体生长初期和生长末期（8月下旬~9月下旬）进行，以生长末期拉枝效果。一般鸡心果在东北及西北地区栽植时间多为4—5月份。那么起挖前我们要对苗圃提前一周左右进行灌透水处理，使苗木在土壤内充分吸收水分，以弥补北方地区冬季干旱所缺水分，以利保苗成活。

矮化鸡心果树苗定植密度为1.5-2 × 3.5-4m，是密植品种，不留双棵。然后再幼苗片真叶展开的时候进行第二次间苗工作，以保优去劣为原则，幼苗之间的间距控制在大约两厘米左右。然后在间苗的时候，我们还要注意做好除草工作，避免杂草抢夺茄子的生长营养。亩栽111-164株，栽植两年后即可挂果，结果较早，丰产期在5年之后，矮化鸡心果树势较小，需要精细化管理。