

泰安薄壳板栗苗 1年板栗树苗移栽季节

产品名称	泰安薄壳板栗苗 1年板栗树苗移栽季节
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	品牌:岳美 型号:1年 产地:山东
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

板栗生长需要氮、磷、钾、钙、铁、硼等营养元素，并要求土壤透水透气，保水保肥性能良好。用沼肥种板栗能满足其生长所需的绝大多数养分，沼肥中富含氮、磷、钾、钙、镁、铁等元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等，腐熟程度高，容易被作物吸收。同时，施用沼肥还能显著地改良土壤，确保板栗生长所需的良好微生态环境，有利于增强其抗冻抗旱能力，减少病虫害。实践证明，板栗施用沼肥可比常规种植方式增产20%左右，且果实个大、重量均匀、味鲜甜、色泽好、耐贮运，大、小年差别也极小。运用沼肥种植板栗的具体方法如下：去雄：在不加人工操控的情况下，板栗雄花与雌花的份额多半为20~50 1，过多的雄花会消耗许多养分物质，使产值下降。因此，要将大有很多雄花序在长2厘米时去除，只留新梢上端3~5个花序，使雄花和雌花的份额保持在5 1摆布。此外，增施钾肥也有利于按捺雄花序过旺成长。板栗苗缺铁症防治。目前应用的树冠喷施铁肥，树干注射，或结合有机肥土壤施入，通常会有一定的防治效果，但效果不够理想，

或见效慢，或不会操作。由此，我们经过试验，总结出快速矫治板栗苗缺铁症的方法。1
，选用药剂：90%的硫酸亚铁150倍。板栗较喜水。通常发芽前和果实迅速增长期各灌水
一次，有利于果树正常生长发育和果实品质上升。(七)修剪：板栗树修剪分冬剪和夏剪。
实力。(八)疏花疏果和授粉：疏花直接可以用手摘除后生的小花，劣花，尽量保留先生的
大花，好花，通常任意一个结果枝保留1-3个雌花为宜。

泰安薄壳板栗苗 1年板栗树苗移栽季节

板栗增产新措施

1、重施采后基肥。施基肥应选择在板栗采收后，一般在10月底前进行。需以树冠滴水为
界，环状开挖约70厘米宽的施肥沟，每棵施沼肥70公斤（可依据当年果实数量和树冠大小
适当增减），另可将硼砂按常量与沼渣混合施入。施肥后应覆土。

2、花前施催芽肥。施肥时间为4月，在每棵树冠滴水周围开挖深、宽各30厘米左右的浅沟
，施入沼液100公斤左右，另加硼砂0.3公斤，迅速覆土，同时用澄清过滤的沼液，对树冠
进行喷施，每隔10天左右一次。

3、花期饱施壮果肥。每年6 7月，由于开花和果实的生长，栗数需要较多的养分，这时

在树冠滴水圈处开挖深、宽各20厘米左右的浅沟，施入沼液50公斤左右，另加0.5公斤磷酸二氢钾，同时还要对树冠叶面喷施沼液，每隔10天喷施一次。若在盛花期、果实膨大期各施一次，同时配合喷施壮果蒂灵，效果更佳。栽植。随起苗随栽植，一时栽不完的苗木可实施假植。11月中旬起苗，起苗要求根系完整，须根多，无病虫害。在11月中、下旬，白天气温不止高于0℃时均可开展栽植，如若不然根系在外时易，不要栽植。栽植时放入苗木，回填周围地区潮湿的中层土，填土5厘米厚，提一提苗，用脚踏实或镐头捣实，使根系与潮湿土紧密接触，这一步是栽植成活的关键步骤，一定不可马虎，砸得越结实越好，用群众的话说，硬得象铁一样子才好。三后回填表层土至地面并用脚踏实。苗木栽植深度以超过苗木原土印10-20厘米为宜。

(三)合理配置授粉树：栗树主要靠风传播花粉，但缘于栗树有雌雄花异熟和自花结实现象，单一品种经常因授粉不良而产生空苞。所以新建的栗园必须配制10%授粉树。实践证明，我市用处暑红作授粉树较好。

(四)合理密植。板栗苗缺铁症如何快速防治板栗苗缺铁症主要危害板栗苗的叶片，尤其是新梢顶端叶片，起初叶色变黄，叶脉仍保持绿色，使叶片呈绿化网纹状，旺盛生长期尤为明显；严重时，叶片完全失绿，变黄，新梢顶端枯死，影响板栗苗正常发育，导致树势衰弱，易受冻害及其它病害的侵染。