

早红考蜜斯梨苗品种大全及简介

产品名称	早红考蜜斯梨苗品种大全及简介
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

树形采用纺锤形或小冠疏层形。该品种树姿直立性强,1年生枝条就应开张角度。冬剪时多长放,少疏枝,少短截;夏剪时注意运用摘心、扭梢、拿枝等措施,控制旺长。对适龄不结果的旺树,可在5月中下旬对主枝进行环剥或双道环割促使成花。

在陕西海拔470m,年降水量514mm,年平均气温14.8℃,无霜期205-236天,3月中旬萌芽,4月初盛花,7月底至8月初成熟,果实发育期100天左右,11月中旬叶片开始脱落。在用火烧土盖种,盖土厚度以不见种子为宜,盖土后在畦面上覆盖一层稻草,再浇足水,保温保湿,以利出苗。播种三天内每天早晚各浇水一次,待种子发芽时撤除稻草,稀疏留下一些稻草,保持土壤湿润,每隔三天浇一次稀薄的方式,促进幼苗生长。高温、高湿、多雨、少日照。各种果树病虫害的发展也进入了高峰;果树容易徒长,不利花芽分化;苹果、梨处于第二次果实旺盛生长期。所以此期管理的好坏,不但影响当年果树的产量和果实品质,也关系到来年果树的花芽多少、产量高低。因此,在生产中应抓好以下几点:

梨树的枝类组成是对树冠中各类枝条的数量比例而言,当幼苗生长出5-6片真叶、肉质根长至直径1~2cm肉球时移栽定植,在原整好的畦面上进行移栽,每穴移栽一株。定植时要将苗根伸直,不能弯曲,而且肉质根球要露出地面,每亩定植4500-5000株,定植后浇一次定根水,同时用稀薄的稻草覆盖地面,以免强光暴晒。一般用长、中、短枝和叶丛枝总量的百分数表示。梢比系数指树冠中各类当年生新梢的数量比例而言。一般用中、短梢数量之和与长梢的比值表示。