

# 安顺红提葡萄苗阳光玫瑰葡萄苗

产品名称	安顺红提葡萄苗阳光玫瑰葡萄苗
公司名称	青岛丰华北方种苗专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛平度市大泽山镇谭家芥村
联系电话	18866261017

## 产品详情

葡萄苗基地栽植密度的确定要考虑品种特性、架式、气候因素、立地条件、栽培习惯等多方面因素。栽植方法：按株距挖定植穴，宽度依根系大小定。秋季栽植宜浅种深埋，即将苗直立放在穴中，深度以原苗床时的深度为宜，使根系伸展，分布均匀，填土至一半时，轻轻提苗，使根系与土壤密接，当填土与地平时，踏实浇透水，然后覆土20厘米厚，呈馒头状。来年春，把土扒开至根颈部。春季栽植则宜浅种浅埋，有利于根系早活动，如有条件可用地膜覆盖保温保湿。葡萄裂果严重的影响了其经济效益，因此我们要加强红提葡萄苗基地管理工作。

去卷须和缚蔓为节约树体营养，卷须要尽量去除。梢端的2-3个幼嫩卷须可以保留，以保持生长点优势，待新梢向前延长25厘米以上时再除须。为防止枝蔓折伤和架面分布不均匀，篱架一般在枝蔓30-40厘米处绑一个，棚架一般在枝蔓1米处绑一个。葡萄苗摘叶为改善果穗附近的光照条件，应摘除一部分老叶，促使果实着色。主要作用是为了控制营养生长、促进生殖生长、提高座果率、促进花芽分化、控制结果部位外移、控制架面。一般在果实变软时摘叶。

早熟葡萄苗萌芽后，新梢的生长逐渐迅速生长，且新梢上各节叶腋副梢也陆续萌发生长，进入旺盛的营养生长期，这一时期新梢即将开花、坐果。红提葡萄苗两者都需要消耗大量营养，在养分、水分的争夺上都相当激烈，新梢、副梢、卷须的营养生长需要人为来控制，结果树的开花、坐果，增加粒、穗重尤为重要。所以，葡萄在开花前到初开花的一周时间内，需对新梢进行摘心，掐去嫩尖幼叶，人为的暂时停止新梢延长生长，才能提高日后产量。葡萄苗在进行储存时，需要先对根部进行消毒，防止烂根，提高成活率。

早熟葡萄苗生长期摘心即摘除新梢顶端，可抑制顶端生长。花前摘心，可使同化养分较多地转移到花序，促进花序的生长和花的发育，减少落花落果，提高苗木坐果率。红提葡萄苗自然坐果率较低的品种，如玫瑰香、巨峰等应在花前1周进行，在花序以上留7片叶摘心较为适宜。一般酿酒葡萄的坐果率较高，果穗小，摘心不单独进行，常和引缚新梢同时进行。夏黑葡萄苗5月中旬开花，7月下旬果实成熟，比巨峰上市早，从开花至果实成熟需天数为110天左右，属早熟无核品种。红提葡萄苗采用棚架栽培的葡萄，延长梢可留15~20叶片摘心，其他新梢留8~12片叶摘心。

葡萄苗适宜种植环境：阳光照射太少会酸，太多则过甜。春天发芽时，葡萄喜7-12℃气温，这时不能有霜和冰雹；以下为您整理了几条相关的建议：1、红提葡萄苗肥料管理：在葡萄苗萌芽后半个月，一般次数绿苗新梢长至7~8片叶，株施尿素，20天后株施磷酸二铵，再20天后株施硫酸钾复合肥。葡萄枝生长的时候，红提葡萄苗，温度适宜在20-25℃之间，不凉不热，还要阳光灿烂；秋天，葡萄开始成熟，理想温度20-25℃，凉爽宜人。只有在栽种时掌握其注意事项才能够确保后期种植的过程当中拥有较高的植株成活率，有效地降低了在种植过程当中的损失。

果农在种植葡萄苗的过程当中需要种一起种植的时间，由于葡萄苗一个生长适应能力相对而言比较长，无论是在春季种植或者是秋季种植的话，都能够产生较高的成活率，但是为了能够让其更好的成长，建议用户在种植的过程当中选择秋季种植。葡萄苗的成长年限依据种植技术，以及用肥和结果量等作为前提条件。其中也包括树种、自然环境、保护等等措施。而且抹芽和定梢减少了不必要的枝梢，使架面上的新梢分布更加合理，有利于提高通风透光条件、提高坐果率和果实品质。

果农在种植葡萄苗到时候还要注意适应的温度，湿度以及土壤的酸碱度，只有在这些方面做好实时的监测，才能够确保在后期种植的过程当中葡萄苗木可以更快的生根发芽，并且做到当年结果进入一个比较丰厚结果期。

安顺红提葡萄苗阳光玫瑰葡萄苗由青岛丰华北方种苗专业合作社提供。“山东葡萄苗,山东樱桃苗,葡萄苗基地”就选青岛丰华北方种苗专业合作社（[www.qdfhbf.com](http://www.qdfhbf.com)），公司位于：青岛平度市大泽山镇谭家乔村，多年来，丰华种苗坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丰华种苗期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.fenghuabeifang.cn](http://www.fenghuabeifang.cn)）还是从事无核葡萄苗，山东葡萄苗，抗寒葡萄苗的厂家，欢迎来电咨询。青岛丰华北方种苗专业合作社供应以下葡萄苗品种：早熟葡萄苗品种：红芭拉蒂、黑芭拉多、绍星1号、蜜光、青提、夏日阳光、维多利亚、夏黑、红玛瑙等。