

# 吉林早夏无核 丰华北方苗木批发基地

产品名称	吉林早夏无核 丰华北方苗木批发基地
公司名称	青岛丰华北方种苗专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛平度市大泽山镇谭家夼村
联系电话	18866261017

## 产品详情

葡萄苗基地早夏无核栽种注意事项：

葡萄光照不足时，新梢生长细弱，芽分化不良，叶片薄，叶色淡，果穗小，落花落果多，产量、品质差。因此栽种时要选择光照好的地方，并注意改善架面的通风透光条件。同时，正确设计行向、行距和采用合理的整修剪技术。

栽葡萄苗前按规划定点挖深、宽各1米的栽植坑，密植栽培可挖深、宽各1米的栽植沟。无论挖坑或挖沟，都要将表土和心土分放两边。

早夏无核苗木有完整健壮根系，枝粗节短，芽子饱满，皮有光泽，无病虫害是选苗的关键。栽前先将苗木根系浸在水中或泡在稀泥浆内。

葡萄苗对土壤的适应性强，沼泽和盐碱地是不适宜生的，其余各类型土壤都是可以的，而以肥沃的沙壤土为适宜。不适宜的地区。也可以通过农业工程措施及栽培技术进行改土栽培。

早夏无核栽苗后要修树盘浇透水，待水下渗后再用修苗盘的土散堆在树根周围，用来防止水分蒸发。月数后再修苗盘补充浇水。

早夏无核整地下种，及时搭架。不论是大田种植还是庭院栽培，都要先整好地，施足水肥，选种下播。要喷洒新高脂膜以增强肥效保持墒情，促发芽促出苗。要搭好棚架，原则是既要方便架下作叶，又要提高架面覆盖率。搭架要在出苗前或移栽前结束。

葡萄苗期管理，强花促果。2、浇水：定植后，一定浇透水，新梢达到15公分时，15天浇水一次，新梢超过30公分后，20天浇水一次，然后覆盖地膜，覆盖地膜可以保湿保温。一是扶苗上架，促苗速长。

早夏无核适时追施提苗肥和花果肥，并喷洒新高脂膜以增肥效。葡萄生长进入花蕾期、幼果期和果实膨大期，要适时喷洒壮果蒂灵，促其把柄增，增强授粉能力、强化营养运输通畅，加快果实发育膨大。防果锈病，防裂果，提高果面着色和光亮度。

葡萄苗基地对繁育葡萄苗木积累了丰富的经验，丰华北方合作社成立以来，我们坚持“诚信文本，用户至上”的经营宗旨，在经营活动中保障苗木的品种纯度和质量，信誉度高，售后服务好，以良好的信誉和服务获取了用户的信赖。

夏天葡萄种植时，要留意预防日灼问题，日灼是怎样形成的呢？

日灼病主要原因是夏季高温，没有叶子遮挡露在光照下的葡萄长时间，果面温度过高，造成果皮灼伤，失水后形成了褐斑。果农在种植葡萄苗的过程当中需要种一起种植的时间，由于葡萄苗一个生长适应能力相对而言比较长，无论是在春季种植或者是秋季种植的话，都能够产生较高的成活率，但是为了能够让其更好的成长，建议用户在种植的过程当中选择秋季种植。产生日灼也是由于果实水分供应不足造成的，一年之中主要发生在6月中旬至7月上旬，通常发生在幼果期或膨大期，起初表现为失水、凹陷、浅褐色小斑，时间推移病情的加重，病斑面积在两个小时内就会出现大面积病斑。

预防葡萄苗日灼的措施：

- 1、早夏无核增强追肥，早夏无核，在合理的施肥范围内尽可能多施有机肥，提升葡萄苗的植株抗逆性。
- 2、在种植挑选合理的栽种密度，选用棚架栽培或双篱架栽培，提升果穗上的叶片遮盖量，使葡萄果穗处在荫凉的地方。
- 3、适当浇水，夏季温度过高，植株容易失水，但也不可以浇水过多，浇灌过多容易使土壤过涝，从而抑制根部呼吸。因此要依据土壤水分来浇水。
- 4、在阴雨过后的高温天气，对叶片和果穗上喷施新高脂膜，形成保护膜，防范日灼。
- 5、采用葡萄套袋，套袋除了能够大大降低日灼的产生之外，还可以提升葡萄的外观品质，减少病虫害的侵扰。

吉林早夏无核-丰华北方苗木批发基地由青岛丰华北方种苗专业合作社提供。先用铁锹或镐锄将防寒土堆两侧的土去掉一部分，再用钉耙、四齿类工具小心的将其余防寒土除去，同时将枝蔓扒出。青岛丰华北方种苗专业合作社（[www.qdfhbf.com](http://www.qdfhbf.com)）是山东青岛花木的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在丰华种苗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创丰华种苗更加美好的未来。同时本公司（[www.qdfenghuabf.com](http://www.qdfenghuabf.com)）还是从事山东大樱桃苗，矮化大樱桃苗，美早樱桃苗的服务商，欢迎来电咨询。