

## 3公分冬桃苗 映霜红桃树苗中熟硬肉树苗

产品名称	3公分冬桃苗 映霜红桃树苗中熟硬肉树苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	品牌:岳美 型号:2公分 产地:山东
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

## 产品详情

桃苗新品如何种植技术枝接法 用果树枝条的一段作为接穗而进行的嫁接即为枝接法，枝接法主要在休眠期进行。枝接时间以砧木树液已经开始活动，接穗还没有萌动时。枝接的优势在于成活率高，接苗生长较快;但枝接比芽接方法要难，工作效率比芽接低，与此同时要求砧木比较粗。这种方法通常多用于苗圃春季的补接、高接换种或者伤疤桥接等。比较常用的有以下几种:

1.切接是枝接法中常用方法，比较适合用在小砧木上。切接一般是在接穗的基部削两个斜面，一个长，一个短，长面长为2~3厘米，位于侧芽的同侧，在长斜面的对面削一个长度在1厘米左右的马耳形短斜面。在距离地面5~8厘米处将砧木剪断，将砧木的断面削平，在木质部的边缘向下直切，切口的宽度要与接穗长斜面的宽度相同，但是深度要稍微长于接穗的长斜面。将接穗插入砧木切口，长斜面要向里，使接穗与砧木的形成层对准，若不能两边对齐，应将一边对齐。后再用塑料条将其包严绑紧。

2.桃苗新品如何种植技术和嫁接标准的要求是在生产上应用比较多的种枝接方法，通常比较适用于较粗的砧木。劈接是在拔德基部2个长的创面，长度为3~5厘米。

## 果园对桃苗土肥水和病虫的管理

果园对桃苗土肥水和病虫的管理。利于保护气性好，土壤的固液、气状态均能良性运转，土壤结构较如土壤结构，可以防止土壤板结，盐渍等。覆草后:土壤透。能高土壤肥力。果园覆草2~-3年后，草经风吹、日晒、南淋、法有霸冻有机质的含量迅速培肥地力，使土壤疏松肥沃。果园覆草的方树盘覆盖、行间覆盖、全园覆盖三种。的作用，发生腐烂.结合施肥进行压埋,可大幅地提高土壤中。桃苗。

果园覆草，覆盖材料可因地制宜，有麦草稻草、玉米秸、豆秸、野草、树叶等。覆盖前要精细整地、灌水。为使覆盖物迅速腐烂，覆草前平果园地面上撒施氮肥。初次覆草厚度为15~20厘米。全园覆草,行间可留0.5米作业道，以便灌水和果树管理。覆草的时间多在5- 6月份，过早会使果园地温提升慢，影响

根系生长。以后逐年加盖维持20厘米厚度。也可于秋季翻压，次年再重新覆草。第1次覆草每亩用草量约1500千克，以后每年只补充腐世掉的部分。平均每年用草量约800千克。