

上海市早酥红梨苗这里便宜

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 上海市早酥红梨苗这里便宜 |
| 公司名称 | 泰安开发区林泽园艺场 |
| 价格 | 2.60/棵 |
| 规格参数 | 品种:红梨苗批发 高度:1.8m 粗度:1cm |
| 公司地址 | 山东 泰安市岱岳区 北集坡镇 |
| 联系电话 | 86-05388913889 13405384433 |

产品详情

八月酥：果实近圆形、黄绿色，果面光滑，蜡质较多，5心室，6~10粒种子，果肉黄白色，平均单果重260g，大单果重800g。生长健壮，花期四月中上旬，抗黑星病能力强，果实室温下可贮藏1—2个月。七月酥：七月酥梨果实大，平均单果重220克，大果重520克，卵圆形，果实纵径7.5cm。喷粉时每份花粉可加20-30份干淀粉，立即使用；液体授粉可配成花粉悬浮液。其配制方法是：5kg水、10g花粉、250g白糖、15g硼砂和15g尿素，混合过滤喷布，随配随用。二、花期防冻，保花保果梨树开花早，花整齐，花期霜冻造成损失很大，甚至绝收，必须做好霜冻预防工作。二、单层高位开心形中心推出的树形，干高60-80厘米，中心干高1.6-1.8米，树高3-3.5米，在中心干上均匀排列着12-15个长轴式大型结果枝组，无明显层次，很终叶幕厚度2-2.5m。果皮薄，黄褐色，果点较小中等密度，表面光滑。果肉白色，肉质松脆，汁多味甜，石细胞少，含糖量15.5%-16%，可溶性形物12.7%，品质上等。果实极耐贮藏，窖藏可贮藏至翌年5月。成熟极晚，10月中下旬成熟。

喷粉时每份花粉可加20-30份干淀粉，立即使用；液体授粉可配成花粉悬浮液。其配制方法是：5kg水、10g花粉、250g白糖、15g硼砂和15g尿素，混合过滤喷布，随配随用。二、花期防冻，保花保果梨树开花早，花整齐，花期霜冻造成损失很大，甚至绝收，必须做好霜冻预防工作。加工品种及较耐贮藏品种应集中成片栽培，以利批量发放，为加工厂及时提供原料，为边远缺桃地区提供优质商品桃。（二）低矮树形矮化密植是梨树栽培发展的方向，因矮化密植能充分利用土地和空间，使果树早果、丰产稳产、优质，这就要求与之相适应的低矮树形。

中熟梨换代品种——圆黄梨圆黄梨... 早熟梨新秀——绿宝石梨绿宝石梨是用早酥梨和幸水梨杂交育成的早熟梨新品种。果实近圆形,中型果,均匀单果重268克,很大单果重446克。果皮黄绿色,果点稀少,果面洁净,外观漂亮。5米，有一个中心干，上下着生10-15

个大分枝，称为枝组，枝组的粗度和长势不超过主干。中心干每 20 厘米留一分枝，无明显层次，向四方均匀分布，自然错落着生，互不影响，与主干角度 70-80 度，适于每公顷栽植 990-1665 株的密植园。

（一）梨树地势与坡向选择 梨树对地形、地势、土壤的要求不严，不论山地、滩地、砂土地、红黄壤地、盐碱地、微酸性土上都能适应。但以土壤疏松较肥沃的砂壤土、砂土、壤土为宜，要求地势高旷、排水良好、土层深厚、地下水位较低，这样结果质量好。

可采用以下措施：1、开花前灌水：能降低地温推迟花期，减轻或避免霜冻为害。2、树干涂白：开花前将树干涂白，可使树体温度上升缓慢，延迟开花期 2-3 天，避免或减轻霜冻为害。3、熏烟防霜冻：熏烟能减少土壤热量的辐射蒸发，同时烟粒可吸附潮气，使水气凝成液体而放出热量，提高气温。日本的很多种多样，树形有水平形、杯状形、漏斗形、折衷形等，能将树高控制在 3 米以内，果品丰产优质。（三）栽植密度 随着科学技术的不断发展，梨树栽培方式逐渐由乔化稀植向矮化密植变革。密植是获得早期丰产、提高单位面积产量的有效栽培方式，它可以增加叶面积，有效地利用光能，经济利用土地。

适应性广,合适多种土壤环境条件培育。抗性强,格外耐涝、耐盐碱才干极强。病虫害少,抗黑星病、缩果病、蚜虫及梨木虱等病虫害。经各地试种,其概括性状远远逾越新水、幸水、丰水、早酥等品种,极有发展前途,是如今早熟梨品种中的佼佼者。早酥红梨更新复壮力稍差,要留意少负荷维持壮树,多留截枝条。

老到早,长江流域一般果实在7月上中旬老到,老到后可一贯延迟到8月上中旬采收,不落果。该品种树势健旺,幼树树姿直立,成龄树关闭,萌生力强,成枝力中等,有较多腋花芽效果,早果丰收性好。一般培育第2年见果,第3年667平方米(1亩)产1000公斤,第4年产达3500公斤。

果皮薄,果心小,可食率高(90%)。果肉白色,酥脆,无渣,石细胞极少,汁液特多,味甜具清香,口感很好;可溶性固形物含量12.5%~16.1%,总糖8.7%~9.8%,酸0.08%~0.17%,糖酸比68.