

# 云南临沧乔化鲁丽苹果苗优缺点-九州红家庭农场

产品名称	云南临沧乔化鲁丽苹果苗优缺点-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

云南临沧乔化鲁丽苹果苗优缺点-九州红家庭农场当前苹果栽培中，密植栽培已成主要趋势，乔化鲁丽苹果苗密植栽培也是缩短生产周期、提高产量和品质的重要手段。在苹果高密栽培中，树形选择和修剪用法是很关键的问题。在密植栽培中，目前国外运用较多的树形主要有细长纺锤形、纵轴形和超细纺锤形等。乔化鲁丽苹果苗细长纺锤形适合于树高1.8-2.4米，每亩栽115-247株，因矮化砧木固着性差及整形本身的需要，整形过程中需设支柱。一些果园由于管理不当或病虫害的原因出现偏冠，有些果园特别是干性较弱的品种，出现歪干现象，严重影响果园群体结构和经济效益；许多果园有上大下小的问题，上部枝条多而旺，严重遮光，下部枝条光照差，难以成花结果，即所谓“上有天棚遮太阳，下面枝条不见光”定植时选用有分枝的大苗，定植后头几年很少修剪，否则会刺激生长而延缓结果。短截过多过重同样是受传统修剪方法的影响，整形修剪中短截过多，甚至对树冠即将交接或已经交接的树，延长枝还继续短截，使树势偏旺，相临树冠交接更加严重。培养枝组也多采用短截的方法，使枝组多轴延伸，竞争旺长。强旺的主枝疏掉，留者弯倒削弱长势促花。当第三或第四年树体开始交接时，要有选择地疏枝。疏枝时基部留2-3厘米的短桩，利用下部瘿芽或隐芽促发弱枝，将来成为结果枝。

我国苹果目前应用最多的树形是小冠疏层形、自由纺锤形和细长纺锤形或介于它们之间的多种小冠类型树枝达到预定大小后，通过回缩修剪手法维持树冠和使树体保持圆锥形。冬剪原则中干上着生的主枝，粗度要小于中干粗的1/2，中干不短截。三角梅在夏季高温的时候会休眠，所以这时候三角梅总是死气沉沉的，缺点劲儿。夏季三角梅更需要管理，如果放任不管植株状态就不好，我前几天给三角梅突发奇想给三角梅吃了两口西瓜，结果我的三角梅突然就特别“开心”，花苞长个不停。给三角梅喂两口西瓜甜润多汁的西瓜和夏天最相配，可以说无西瓜不夏天，西瓜的瓢吃完后留下的西瓜皮可以养花。西瓜皮可以沤成花肥用来浇花，这个经验我也是从别的花友那里学来的，这次给三角梅用了西瓜肥，效果还真不错。及时疏掉密挤枝和进行老枝更新，保持良好的通风透光条件。侧生分枝上不留直径大于其直径1/2的分枝。疏除下部小枝，壮枝回缩到弱的下垂枝处。不结果的骨干枝太多短枝及时更新，防止结果部位外移。而有些果园虽然进行了落头，但由于方法不当出现这样那样的问题，一些果园出现落头过急反旺的情况进入盛果期后限制树体高度，维持树体上下平衡，内外结果。乔化鲁丽苹果苗纵轴形适用于亩栽82-148株。整形时需设支架，

一般用5条等距离的水平铁丝加上支柱做成，或者每株用两条水平铁丝加一根垂直木棍或竹竿，木棍绑于铁丝上。修剪过重或过轻在生产中，整形修剪的轻重把握不好就容易走向两个极端。由于受传统大冠稀植修剪技术的影响，过于强调整形，短截修剪过多过重，使树体长势强旺，而冠体过大。整形完毕全树高3米左右。修剪原则为能早期丰产，前期很少修剪。定植用独干苗时，植后定干；用分枝苗则不需定干。中干不短截，有时疏掉强中干而换成弱中干时也不短截。这样既利于早结果、控制树势，又限制了树体高度。纵轴形中干较弱，分枝稀疏，需将其绑到铁丝或支柱上以防折断。没有根据树龄特性进行修剪幼树期，以快速培养树形为目的，管理上多采用短截等方法，增加分枝；盛果期以调节为主，通过适当修剪调节树体平衡、光照分布、树势的强弱等；衰老期则是尽量集中营养，采用更新、回缩复壮等方法延长结果年限。同时夏季通过对前部第三、四个侧枝摘心来促进分枝。一些果园由于管理不当或病虫害的原因出现偏冠，有些果园特别是干性较弱的品种，出现歪干现象，严重影响果园群体结构和经济效益；许多果园有上大下小的问题，上部枝条多而旺，严重遮光，下部枝条光照差，难以成花结果，即所谓“上有天棚遮太阳，下面枝条不见光”次侧枝摘心在枝条长5-10厘米时进行，可间隔两周再次摘心，促进分枝。定植后2-3年每年都要摘心季摘心做得好则冬剪时仅去掉旺枝和下部冗枝。一些新栽苗木或露地苗圃因积水根系萌发新根慢或根系逐渐腐烂，造成苗木停止生长或死苗。雨后干旱高温造成落叶死苗。针对灾情，建议采取以下补救技术措施：雨后果园及时开沟排水晒田，力保大雨果园、树盘不积水。已经积水的果园要抓紧开沟排水，水淹较轻的果园，雨后要及时疏通渠道，排出积水；将树盘周围1米内的淤泥清理出园，保持树体正常的呼吸代谢。水淹严重的果园，要在果树行间挖排水沟，以降低地下水位，程度保持土壤通气状态。对2-3年生的分枝回缩到基部花芽或弱枝上；使结果部位靠近中干。第三、四年出现遮荫时，需疏枝通光，首先分1-2年疏掉下层分枝，余下4-5个分枝永久保留。冬剪疏枝时保留足够的结果枝，有利于控制中干的长势。与细长纺锤形一样，维持树体大小也靠回缩更新。行间通过回缩及更新维持圆锥形树冠，行内的树形则不重要，形成树墙。对于纵轴形的树来说，控制中干要有耐心，如果修剪过早，会促使中干旺长形成“树上长树”。在大冠稀植向小冠密植栽培转化过程中，因整形修剪不当，使树形结构普遍出现了问题需等到到早期的产量足能树势时开始修剪。一般4-6年进入大量结果期时再修剪。此时树体可能已高于顶层铁丝1.2-1.5米，要落头至接近顶层铁丝的部位，宜从2-3年生枝段剪截。